

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷一百三十六 明 周王朱橚 撰

傷寒門

傷寒頭痛

論

夫傷寒頭痛者邪氣循陽脈上攻於頭也是以傷寒傷風溫病熱病風溫病皆有頭痛症者蓋頭痛皆陽症也故太陽頭痛必發熱惡寒陽明頭痛不惡寒反惡熱少陽頭痛脈弦細而發熱至於三陰脈從足至胸皆不至

頭惟厥陰脈挾胃屬肝絡膽循喉嚨上頂額連目出額
故仲景止有厥陰頭痛一症治以吳茱萸湯者是也

又傷寒頭痛謂邪氣外在經絡上攻於頭所致也難經
曰三陽經受風寒伏留而不去則名厥頭痛言三陽之經
上於頭爾然傷寒頭痛者太陽專主也何者以太陽之
經起於目內背上頭交巔上入絡腦經所謂太陽受病
者頭頂痛腰脊強又曰七日病衰頭痛少愈雖然陽明
少陽亦有頭痛不若太陽之專主也蓋太陽為病屬表

而頭痛則專主表症雖風寒之不同必待發散而後已
太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘
者傷寒也麻黃湯主之太陽病頭痛發熱汗出惡風者
中風也桂枝湯主之雖有傷寒六七日不大便頭痛有
熱者可與調胃承氣湯下之也又云若小便清者知熱
不在裏仍在表也當以桂枝湯以頭痛未去雖不大便
六七日其小便清者猶為在表是知頭痛屬表者明矣
頭痛一切屬三陽經也而陰病亦有頭痛乎太陰少陰

二經之脈皆上至頸胸中而還不上循頭則無頭痛之症惟厥陰之脈循喉嚨之後上入頂額連目絲上出額與督脈會於巔病亦有頭痛經曰乾嘔吐涎沫者吳茱萸湯主之者是矣夫頭者精明之府也神明居之小小邪氣作為頭痛者必曰發散而可也其或痛甚入連於腦而手足寒者又為真病豈但發散而已哉嗚呼頭痛為外病猶有不可治者又矧臟腑之疾乎又傷寒頭痛者是外中風邪上注腦中三陽之脈受於風寒伏留不

去則流傳於心肺故使上焦壅滯心煩鼻塞壯熱頭痛也歌括惡寒發熱太陽經惡熱頭痛胃氣蒸脈細而強魚發熱少陽頭痛自分明又云三陰本沒頭痛疼若
有頭疼屬厥陰非次頭痛涎作病心煩鼻塞溫家尋又
論云太陽惡寒發頭疼無汗麻黃湯有汗桂枝湯已發
汗未發汗頭疼如破者連鬚葱白湯不已者葛根葱白
湯陽明頭痛胃氣所蒸也調胃承氣湯少陽頭疼小柴
胡湯涎沫頭疼瓜蒂搐鼻法溫家鼻塞頭疼瓜蒂搐鼻

法去鼻中黃水即愈厥陰頭疼脈必微浮浮者欲愈也
不愈者小建中湯外症發熱似瘡者欲愈也宜桂枝麻
黃各半湯又云三陰無頭疼至吳茱萸症却云乾嘔吐
涎沫頭疼屬少陰以此論之少陰亦有頭疼但稀少耳
孫真人云少陰傷寒不壯熱不頭疼其稀少可知少陰
身雖有熱而無頭疼厥陰有頭疼而無身熱而又頭疼
屬陽症無疑矣歌括頭痛惡冷太陽先惡熱陽明脈細
弦濕鼻塞兮痰膈滿厥陰乾嘔吐清涎又頭痛屬三陽

陽明少陽皆有之而太陽則專主是也太陽專主頭痛則頭痛之屬表症者居多陽明少陽又次而輕耳陰經絡上不至頭無頭痛惟厥陰循喉嚨之後上連目絲頂巔有頭痛乾嘔吐涎可用吳茱萸湯一症却無身熱亦與陽症不同也雖然太陰少陰其經從足至胸並無頭痛是固然耳然風溫病在少陰濕溫病在太陰而頭反痛至於陰毒亦然又是又某病則又有某症脈絡相通不可拘也若夫頭痛劇甚入連於腦手足俱寒此則真痛

神丹在手其能救乎諸無熱頭疼如斧劈用生薑葱白煎湯下若頭疼脈數發熱惡寒而身不痛左手脈平和此名食積也傷食亦令人頭痛脈數發熱但驗左手人迎脈平和身不疼痛者是也甲乙經云人迎盛緊傷於寒氣口盛緊傷於食

左手關前一分者人迎之位也
右手關前一分者氣口之位也

蓋

人迎主外氣口主中以此別之傷食之症由脾胃伏熱因食不消發熱似傷寒却身不疼痛此為異耳若膈實嘔吐食在上脘宜吐之若心腹滿痛者宜下之治中湯

五積散黑神丸可選用也

方

石膏散

出聖惠方

治傷寒頭痛壯熱

石膏

桂心

細辛

白朮

桔梗

去蘆頭

乾薑

炮製

剉薄荷

各半兩

麻黃

去根節

赤芍藥

附子

炮製去皮臍各三分

甘草

一兩炙微赤剉

右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱

白七寸豉五十粒煎至六分去滓不計時候稍熱

服

黃芩散

治傷寒頭痛心神煩熱四肢不利

黃芩

甘草

炙微赤剉各半兩

赤芍藥

桂心

細辛

各三

分麻黃

去根節

前胡

去蘆頭各一兩

石膏

二兩

右搗篩為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治傷寒壅熱頭痛不可忍宜服此方

出聖惠方

石膏

二兩

滑石

一兩

黃芩

柴胡

去苗

赤芍藥

前胡

去蘆

頭

犀角屑

甘草

炙微赤剉

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃各三分

右搗篩為散每服五錢以水一大盞入淡竹葉三七

片煎至五分去滓不計時候稍熟服

厚朴散 治傷寒壯熱頭痛煩燥無汗

厚朴

去粗皮塗生姜汁炙令香熟

甘草

炙微赤剉

附子

炮製去皮臍

陳橘

皮

湯浸去白穰焙

麻黃

去根節

川大黃

剉碎微炒各一兩

吳茱萸

湯浸

七遍焙乾微炒

乾薑

炮剉

前胡

去蘆頭各半兩

右搗羅為細散每服三錢以水一中盞入生薑半分

煎至六分去生薑不計時候和滓稍熟服以衣覆

取汗未汗再服

旋復花散

出聖惠方

治傷寒頭痛心膈痰壅

旋復花

甘菊花 芎藭

各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

皂莢

樹白皮

三兩塗酥炙赤色

右搗羅為細散每服二錢以水一中盞入荊芥七穗

煎至六分不計時候和滓熟服

甘菊花散

治傷寒痰壅頭痛心煩四肢拘急不得睡

卧

甘菊花

旋復花

蔓荊子

細辛

枳殼

麴炒微黃

去穢甘草

炙微赤剉各半兩

防風

去蘆

芎藭

酸棗仁

葳蕤

各一兩

右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分

煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒汗後頭痛不解宜服此方

出聖惠方

石膏

太陰玄精石

各一兩

麻黃

二兩去根節

甘草

半兩炙微

赤炒

右咬咀每服三錢水一中盞入竹葉二七片煎至六

分去滓不計時候溫服

通頂吹鼻散

出聖惠方

治傷寒頭痛不止

藜蘆

一分去蘆頭

瓜蒂

馬牙硝

各二分

龍腦

研

麝香

各研

半錢

右搗羅為細散研龍腦麝香令勻用少許吹入鼻中

得嚏差

黃芩湯

出黃
命方

治傷寒頭痛不止

黃芩

去黑
心

石膏

研

茵陳子蒿

柴胡

去
苗

桔梗

剉
炒

牡

丹皮

荊芥穗

梔子仁

各一
分

麻黃

去根節
半兩

右麤搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓食後

溫服一方和滓服

吳茱萸湯

出金
匱方

治傷寒厥陰症乾嘔吐涎沫頭痛

吳茱萸

二兩
洗焙

人參

一兩
半

右㕮咀如麻豆每服五錢以水一中盞半入生薑一

棗大拍碎棗三枚去核同煎至八分去滓溫服若
急者陰毒甘草湯白朮散附子肉桂散迴陽丹反
陰丹至於陰盛隔陽霹靂散火焰散隨經部分選
用之

石膏丸

出聖濟
總錄

治傷寒頭痛痰盛

石膏

細研水飛
過四兩

烏頭

去皮臍生
用一兩

消石

研一
兩半

太陰玄

精石

研二
兩

右搗研為末和勻如粉以生薑自然汁煮麴糊和丸

如梧桐子大每服十九至十五九荊芥茶下甚者

不過三服

聖白散

出聖濟總錄

治傷寒頭痛壯熱發汗化痰

附子

一枚大者炮製去皮臍

白附子

生

天南星

炮半兩

白芷

一分

半夏

洗去滑為末生薑汁和作餅焙乾

麻黃

去根節各五兩

石膏

碎研一兩

麝香

香

研半錢

右搥羅六味為末入石膏麝香末同研令勻每服半

錢以熟葱茶調下甚者連進三服

太乙散

出王氏博濟方

治傷寒頭疼

附子

大者炮製去皮臍一兩

甘草

生

石韋

去毛各半兩

石膏

研

滑

石

研各二兩

右搗羅三味為細散入石膏滑石末同研勻每服二

錢以葱白薄荷茶調下

白鮮皮湯

出聖濟總錄

治傷寒頭痛

白鮮皮

菊花

石膏

研

荆芥穗

各一兩

桂

去粗皮一分

甘草

炙半兩

麻黃

去節二兩

右麤搗篩每服三錢以水一盞煎七分去滓溫服

茶調散

出聖濟
總錄

治傷寒頭痛不止

石膏

碎研
二兩

羌活

去蘆頭
生用

蒼朮

去
皮

甘草

半生
半炙

芎藭

茵陳蒿

荊芥穗

各一
兩

桂

去粗皮
半兩

右搗羅為散每服一錢用臘茶一錢同葱白湯點熟

服

麝香雙九

出聖濟
總錄

治傷寒頭痛目眩汗出

麝香

研
龍腦

研各
一分

丹砂

一兩
半研

雄黃

研

木香

赤箭

各一兩

牛黃

研

白花蛇肉

烏蛇肉

各酒浸炙

乾蠍

炒去毒

羚羊角

鎊各半兩

天南星

炮

麻黃

去根節各二兩

白附子

生

天

麻

酒浸焙

防風

去

零陵香葉

三分

藿香葉

天雄

炮製去皮

臍各

三分

右搗羅十四味為末入麝香等五味研勻煉蜜丸如

小鷄頭實大每服二丸細嚼溫酒下不拘時候

天南星丸

出聖濟總錄

治傷寒頭痛

天南星

末二兩

石膏

末二兩水飛過

右填牛膽中用薄荷包更用荷葉外包於風道中掛
以清明節候入龍腦少許滴雪水丸如鷄子大每
服一丸嚼薄荷湯下

石膏湯

出王氏
博濟方

治傷寒頭痛不可忍

石膏

研碎

麻黃

去根節
各一兩

何首烏

去黑皮
半兩

葛根

剉三分

右麤搗篩每服三錢以生薑三片水一盞同煎至八

分去滓溫服

石膏煮散

出聖濟
總錄

治傷寒頭痛

石膏

研水飛過
一兩半

旋復花

一兩

白蒺藜

炒

甘菊花

山

梔子仁

茵陳蒿

各半
兩

芎藭

一兩

太陰玄精石

研半
兩

右搗羅六味為細末入石膏等研勻每服三錢以水

一盞入荊芥少許同煎至七分不去滓溫服不拘

時候

一字散

出聖濟
總錄

治傷寒頭痛鼻塞

芎藭

一兩

草烏頭

炮制去皮
尖一兩半

石膏

研二
兩

雄黃

二錢醋
浸一宿

研 焙

右搗羅三味為散入雄黃末研勻每服一字入臘茶

半錢以葱白一寸煎湯點服

瓜蒂散

出聖濟
總錄

治傷寒頭疼胸中滿及發寒熱脈緊而

不大者膈上有痰涎

右用瓜蒂一兩搗羅為散每服一錢溫熱水調下吐

涎愈

人參湯

出聖濟
總錄

治傷寒頭痛自汗壯熱身體拘急喘促

骨節酸疼

人參 甘草

炙各二兩 去粗皮

陳橘皮

湯浸去白焙

白茯苓

去黑皮

防風

去叉

五味子

柴胡

去苗各一兩

附子

炮製去皮臍

半夏

生薑汁浸一伏時各半兩

右剉如麻豆大每服三錢以水一盞入生薑二片棗

二枚劈破同煎至七分去滓熱服不拘時候

麻黃丸

出聖濟總錄

治傷寒解表止頭痛魚治破傷風及一

切諸風

麻黃

去根節湯煮掠去沫焙乾

烏頭

水浸三日洗暴乾炮製去皮臍各四兩

天南

星

炮揅末
四兩

半夏

湯洗去滑
七遍四兩

白芷

三兩

石膏

泥裹火煨
通赤研四

兩

甘草

炙剉
一兩

龍腦

研半
兩

射香

研一
分

右將八味搥研為末水煮天南星和丸如小彈子大

每服一丸葱茶或葱酒嚙下薄荷茶亦得連二三

服此本白龍丸後又加麻黃作六兩寒水石用石

膏末為衣治傷寒至佳小小傷風服之立差解表

藥中此尤神速

白雪丸

出聖濟
總錄

治傷寒頭痛三日以裏可服

烏頭

去皮臍

附子

去皮臍

白附子

天南星

天麻

麻黃

去根節

甘草

並生用各等分

右搗羅為末水浸一宿炊餅和丸如櫻桃大火煅寒

水石粉為衣每服一九熱酒或葱茶嚼下良久以

熱粥投之

前胡湯

出聖濟總錄

治初得傷寒頭痛壯熱

前胡

去蘆頭

半夏

湯浸七遍去滑生薑汁製切焙

玄參

聖者

旋復花

甘草

炙判皮

桂

去粗皮

黃芩

去黑心

桔梗

判炒各一兩

生乾地黃

焙一

兩

右搗篩每服五錢以水一盞半生薑五片煎至八分

去滓熱服不拘時候

四白散

出聖濟
總錄

治傷寒頭痛身熱百節疼痛

蒺藜子

炒去
角

白芷

白附子

炮

白殭蠶

炒各
等分

右搗羅為散每服二錢以清茶或酒調下不拘時候

太陽丹

出和
劑方

治頭痛傷寒感冒風氣積偏正夾腦一切頭

疼風壅痰盛咽膈不利並宜服

腦子

二兩 別研

川芎

甘草

白芷

各一斤

石膏

別研 二斤

大

川烏

炮去皮 臍一斤

右為細末蜜同麴糊丸每兩作一十八粒硃砂為衣

每服一粒薄荷茶嚙下

乾葛湯

出經驗良方

治傷寒頭痛不可忍者

石膏

二兩麻黃

去根節

乾葛

川芎

各一兩

右為細末每服四錢薑三片水一盞煎至七分溫服

治三陽頭痛

出濟生拔萃方

羌活 防風 荊芥 升麻 葛根 白芷 柴

胡 川芎 芍藥 細辛

各等分

右以連鬚葱白煎服分兩旋加若陰症頭痛只用溫中藥足矣乃理中薑附之類是也

石膏湯 治太陽病氣逆面赤頭痛目疼不可忍者

石膏 二兩 碎

綿裹

防風 二兩

兩

葛根 一兩

兩

芍藥 一兩

兩

前胡 一兩

兩

葱白

并根 生薑 二兩 切

三莖

右以水七升先煮葛根減二升去上沫內諸藥煮取

三升去滓溫服一升日三服

傷寒風溫相搏身熱如火面赤頭痛口乾舌燥四肢拘

急引飲

葛根

三兩

防風

二兩

甘草

炙

獨活

括萎根

各一兩

五味

子

半兩

右以水五升先煮葛根減二升去上沫內諸藥煮取

三升去滓溫服五日三服未愈再作服

表裏湯 主太陽陽明合病中風皆大熱頭痛目疼身

重煩燥不大便小便少者

桂枝

麻黃

去節

大黃

酒浸

甘草

炙各一兩

右水煎熱服

千秋丸

主少陰病頭痛不可忍者

芎藭

三兩

天南星

三兩

草烏頭

四兩生

右搗篩以千年韭根汁和丸梧子大白飲下三粒

治傷寒四五日頭痛壯熱胸中煩痛

右用烏梅十四箇鹽五合水一升煎取一半服吐之

和解湯 治少陽病頭痛面赤身體煩疼胸中滿脇下痞腹中痛

前胡 芍藥 厚朴 桔梗 枳實 炙甘草 黃

芩 半夏

生薑

各三兩

葱白

四莖

右以水一斗二升只煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服欬者加五味子二兩

治傷寒頭痛四五日壯熱四肢煩痛不得飲食

出千金方

梔子仁 黃連 黃蘗 大黃

各半兩

好豉

一升

葱白

七
莖

右咬咀以水八升煮上四物六七沸內後入葱白豉
煮得三升頓服一升日三服服訖被覆取汗出即
瘥得汗便止後服勿復再取汗不得汗者復服重
發此藥無忌特宜老小神良

青散

出千金方

治春傷寒頭痛發熱

苦參

厚朴

石膏

各三銖

大黃

細辛

各二兩

麻黃

五兩
烏頭

五枚

右治下篩覺傷寒頭痛發熱以白湯半升和藥方寸
匕投湯中熟訖去滓盡服覆取汗汗出溫粉粉之良
久一服不除宜重服之或當微下利者有大黃故
也

治傷寒頭痛壯熱百節疼痛

出千金方

柴胡 梔子仁 芍藥 知母 各四兩 升麻 黃芩

大青 杏仁

各三兩

石膏

八兩

香豉

一升

右咬咀以水九升煮取二升七合分溫三服若熱盛加

大黃四兩

藿香正氣散 治傷寒頭疼增寒壯熱上喘咳嗽五勞

七傷八般風疾五般膈氣心腹冷痛反胃嘔逆藿亂
吐瀉臟腑虛鳴山嵐瘴氣遍身虛腫婦人胎前產後
小兒脾疳並皆治之

大腹皮 白芷 茯苓 枳殼 羌活

去蘆獨活 去蘆

川芎 防風 半夏 荊芥 薄荷 桑白皮

各一兩

兩

右咬咀如法脩製每服五錢重水盪半生薑三片棗一枚同煎八分去滓溫服滓再煎不拘時如要汗加連鬚葱白一根同煎

治傷寒頭疼至甚不解

出聖惠方

藜蘆 蘇蘇皮

各一分

右搗羅為細散吹少許入鼻中滴少黃水即愈

治傷寒頭痛并太陽頭痛及一切頭風

出本經方

川芎 防風 羌活

各一兩

川烏

炮

草烏

各半兩

麻黃

一兩半

地龍

去土

全蝎

一兩

雄黃

三錢

右為細末每服半錢食後清茶調下

連鬚葱白湯

出活人書

治傷寒已發汗未發汗頭痛如破

生薑

二兩

連鬚葱白

細切半斤

右用水二升煮令減半去滓分三服服不差者服後

葛根葱白湯

惺惺散

出三因方

治傷寒發熱頭疼腦痛

石膏

甘草

生

麻黃

去根節

各等分

右為末每服二錢水一小盞茶半錢葱白三寸碎擘煎三五沸先嚼葱白細嚼下去枕仰卧如發熱再投一服出汗立愈

治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈盛

出肘後方

右用乾艾葉三升以水一斗煮取一升去滓頓服取汗愈不拘時候服

大安湯 治四時傷寒頭痛遍身壯熱口苦舌乾

麻黃

去根節煎
掠去沫

惡實

炒各
三兩

甘草

炙判
二兩

人參

赤茯苓

苓

去黑皮
各半兩

天門冬

去心
焙

麥門冬

去心
焙
各一兩

右麤搗篩每服三錢以水一盞生薑三片棗二枚同煎七分去滓溫服併三服取汗差

解表湯 治初得傷寒時氣壯熱頭痛

甘草

炙剉
二兩

生薑

二兩
半

黑豆

二合

右咬咀每服五錢以水一盞半煎至八分去滓頓服厚衣蓋覆取汗

僧伽應夢人參散

出和
劑方

治傷寒體熱頭痛及風壅痰嗽

咯血等疾宜服

甘草

炙六兩

人參

桔梗

微炒

青皮

去穢

白芷

乾葛

白朮

各三兩

乾薑

炮五錢半

右為細末每服二錢水一盞薑二片棗二枚煎七分

通口進如傷寒入豆豉同煎熟進大效不拘時崇

寧癸未米芾為太常博士始造待漏冒寒得痰痰

嗽如膠有血更三醫不退一日謁太尉蔡公取人

參散一帖并棗見授繼歸有客承議郎薛道至藥

熟進一服良久痰嗽立止客怪問曰公氣色頓快何藥也為道其由求方蔡公又送一帖越三日病全除往見蔡公曰此僧伽藥也元祐中泗守劉士彥病八日不汗女求僧伽甚確夜夢告曰翼日塔中取藥遂於大鉢中取得此藥題印云太平州楊家人參散今太乙局中亦賣無乾薑乾葛兼無分兩疑非真方

和解散

出和劑方

治男女四時傷寒頭痛憎寒壯熱煩燥自

汗咳嗽吐利

厚朴

去粗皮
姜汁炙

陳皮

洗各
四兩

藁本

桔梗

甘草

各半
斤

蒼朮

去皮
一斤

右為麤末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚煎至七分不拘時候熱服熱盛加乾薑四兩頭痛甚間以葱白湯下

十味和解散

出楊氏
家藏方

治頭疼發熱散寒邪肢體倦怠

白朮

一兩

桔梗

一兩

人參

去蘆

當歸

洗焙

陳皮

去白

枳殼

去穢
焙

赤芍藥

防風

甘草

炙各一分

厚朴

姜製半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片葱三莖煎熟服不

拘時候

治身熱頭痛昏重未辨陰陽夾食傷寒暑等疾名橘薑

飲

陳橘皮

水洗不去白二兩

生薑

搥碎不去皮四兩

右以水四碗煎至一碗半每服一盞通口併服呂侍

乾諱希哲居和州歲疫服者多安吳內翰家用之

數效

崔宣武人參石膏湯

出宣明
論方

治傷寒頭痛心煩悶風熱

并汗後餘熱自汗多清頭目定喘嗽

人參

二錢
三分

石膏

一斤

芍

二兩

黃芩

二錢

茯苓

三錢

甘草

半兩

防

風

三錢

右為末每服五錢水一盞半煎至六分去滓溫服不

計時候

治傷寒初患二三日頭痛壯熱

右用葛根五兩香豉一升細剉童子小便六升煎取二升分作二服取汗觸風食葱豉粥

附子丸

治傷寒頭痛壯熱不問陰陽二毒並宜服之

附子

炮製去皮
臍二兩

五味子

一兩

右搗羅為末研飯和丸如桐子大每服三十九茶清

下良久吐得汁即差

五勝散

出本
事方

治傷寒頭痛壯熱骨節疼痛昏沈困倦咳

嗽鼻塞不思飲食兼治傷寒夾冷冷氣慢陰毒

甘草 五味子

石膏

各一兩

乾薑

三兩半

白朮

一兩半

右為細末每服二錢入鹽少許煎至七分通口服如

冷相夾入薑棗煎若治陰毒入艾葉少許同煎

葛根葱白湯

出活人書

治感風熱頭疼不止已發汗未發汗

頭痛如故

葛根 芍藥

川芎

葱白

一把 乾薑

知母

各一兩

右咬咀以水三升煎至一升半去滓每服一盞一方

用生薑

芎藭飲

出肘後方

治傷寒頭疼不止

芎藭

半兩

馬牙硝

研

石膏

研各

一兩

右粗搗篩每服二錢以水一盞入生薑三片好茶一

錢同煎至六分去滓溫服不拘時

治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈盛

右取生蘘荷根葉合搗絞汁服三四升止

人參順氣散

出活人書

治傷寒頭痛憎寒壯熱四肢疼痛

乾葛

甘草

炙

白朮

桔梗

去蘆

香白芷

人參

各一

分
白薑

炮半兩

麻黃

去根節一兩半

右搥羅為細末每服三錢水一大盞生薑三片葱白二寸煎至八分通口服如要出汗連二服

人參敗毒方

出德生堂方

治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒

身體煩痛及痰壅咳嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔噦寒熱並皆治之

人參 赤茯苓 甘草 前胡 芎藭

去蘆

桔梗

枳殼 羌活 川芎 防風 獨活

去蘆

半夏 荊

芥薄荷 桑白皮

各一兩

右咬咀每服五錢重水盪半生薑三片棗一枚同煎
八分去滓溫服滓再煎不拘時如要汗加連鬚葱
白一根同煎

芎辛丸

出海上
名方

治傷寒非時頭痛常服清利眼目

大川芎

二兩

華陰細辛

半兩
去葉

甘草

一分
炙

右為細末煉蜜和丸每兩作八丸每服一丸細嚼用
薄荷茶送下食後服

太乙十神散

出廣南衛生方

治症與本類六味和解散同

升麻

白芍藥

紫蘇葉

香附子

乾葛

白

芷

川芎

陳皮

青皮

甘草

右等分為剉散每服三錢用薑三片葱白二寸煎熟

服取汗為度

普救散 治四時傷寒週身發熱四肢疼痛頭重眼疼

不問陰陽二症並皆治之

蒼朮

一斤米泔水浸三日切焙乾

乾薑

半斤切焙

甘草

四兩炙赤色切細

右為粗末每服二大錢水一中盞煎至七分去滓熱服如要出汗加連根葱白二寸共煎併兩服滓再煎一服不拘時候煎用砂鉢不得銅鐵器初發傷寒亦下此藥汗後勿服

麻黃湯

出鮑氏方

治傷寒脈浮緊而數頭痛身痛發熱惡寒

胸滿而微喘無汗用此得汗身疼發熱若中滿而嘔桂枝湯倍芍藥入人參茯苓半夏川朴

麻黃 桂心

各一兩

甘草

半兩

杏仁

二十箇

右散每服五錢水煎八分食前覆取微汗周匝至足
夏加知母半兩石膏一兩黃芩一分或汗出後無
大熱而喘去桂加石膏感濕兼寒加白朮二兩得
微汗即住藥及濕仍不去腹脇氣動人勿服一方
無杏仁

瓜蒂散

出御藥院方

治太陽經頭痛寒熱方

瓜蒂

子一枚

穿山甲鱗

一片瓦上焙焦

右為細末每用一剋耳許右鼻內嚙大有神效

百餅丸

出御藥院方

解內外傷寒頭痛壯熱增寒腹脹喘急

辰砂

研

黃臘

各半兩

硃砂

研二分

巴豆

去皮心膜油一錢

右除黃蠟外同研令勻次入蠟鎔開和成劑丸如棗

豆大每服二丸新水送下後少時用熱粥投之汗

出立愈

八解散

出楊氏家藏方

解利傷寒治頭疼發熱渾身拘急四肢

疼痛

荊芥穗

三兩

防風

去蘆頭

人參

黃芩

麻黃

去根節

肉

桂

去皮

蒼朮

米汁水
浸一宿

甘草

炙各一
兩半

右咬咀每服五錢水一盞半生薑三片大棗一枚淡

豆豉三十粒同煎至一盞去滓溫服併進三服汗

出即差不拘時候

葛根解肌湯

出和
劑方

治傷寒溫病時行寒疫頭疼項強發

熱肢體拘急骨節煩疼腰脊強痛脇胸煩悶

葛根

四兩

麻黃

去節
三兩

肉桂

去粗皮
一兩

甘草

炙二
兩

黃芩

二兩

芍藥

二兩

右為麤末每服三錢水一盞半入棗二枚剝破煎至

八分去滓稍熱服不拘時候取汗出為度

升麻葛根湯

出危
方

治傷寒時疫頭痛增寒壯熱肢體痛

發熱惡寒鼻乾不得睡小兒大人瘡疹已發未發皆
可服兼治寒暄不時人多疾疫乍煖脫衣及暴熱之
次忽變陰寒身體疼痛頭重如石及解傷酒口瘡咽
疼

升麻

一兩

白芍藥

一兩

甘草

一兩

葛根

二兩

右剉散每服四錢水一盞半不拘時潮熱頭疼生薑
三片葱白二根煎咳嗽涎盛生薑三片桑白皮七
寸煎上膈熱薄荷黃芩各少許煎瘡未出加紫草
楂根各半錢葱白二根煎挾熱酒後傷風感寒痰
盛氣促金沸草散合和用生薑三片薄荷七葉桑
白皮七寸烏梅一箇煎小兒量度多少老人加人
參倍芍藥各五錢大段寒即熱服熱即溫服

加減葱豉湯

出肘
後方

治傷寒初覺頭痛內熱脈洪起一二

日便服此

葱白

一虎口大

豉

一升

右用綿裹水三升煮取一升頓服取汗若不出汗更作加葛根三兩水五升煮取二升

中和湯

出楊氏家藏方

治四時傷寒初得病惡寒發熱頭目昏痛肢節酸疼未分陰陽表裏並皆治之

蒼朮

乾葛

桔梗

紫桂

白芷

各二兩

麻黃

茱萸

厚朴

陳皮

各一兩

甘草

半兩

右為細末酒湯任意調下粗末生薑蔥頭水煎亦可

治四時傷寒頭重鼻多清涕神思不快胸中痰實語聲

不出喉中非時間痒

出楊子建
護命方

麻黃

去根

蒼朮

羌活

芎

各一分

甘草

四錢

細辛

三銖

右細羅為末每服二錢水一盞煎取八分食後熱服

獨活湯

出濟生
拔萃方

治傷寒汗下後頭疼起目眩者

防風

獨活

旋復花

當歸

各七錢

右剉細每服七錢生薑同煎

石膏湯

出濟生拔萃方

治傷寒汗下後頭痛不止不可再發汗

石膏

葛根

麻黃

各五錢

黃芩

芍藥

甘草

各七

錢

右剉細每服七錢生薑同煎

金沸草散

出王氏博濟方

治傷寒著熱氣壅盛頭目心胃不利

婦人血風潮發丈夫風氣上攻其狀如中脘有痰令

人壯熱頭痛項筋緊急時發寒熱皆類傷風有寒氣

則汗出如風盛則解利

荊芥穗

四兩

旋覆花

三兩

麻黃

去節
三兩

甘草

一兩
炙

半夏

一兩

淨洗姜

赤芍藥

一兩

汁畧浸

兩

右為末每服三錢水一盞入生薑棗同煎至六分熱服如出汗併三服效活人書用赤茯苓細辛無麻黃赤芍藥

治傷寒熱毒攻心頭痛煩燥面赤舌強硬言語不快狂言妄語忽思狂走入水煩悶精神不足此為傷寒病氣在心診其脈左手寸脈一指偏大如衆脈即可服

此方若舌強硬說話不明急妙手針舌兩岸出惡氣
血即減得病勢也切不可針舌心狂言惡口重加木
通草狂走不住加硝石

出楊子建
護命方

升麻 黃芩 麥冬 去心 玄參 貝母 桔梗 硝石

茈胡 去毛 牡丹皮 去心 連翹子 荊芥穗 羌活 麻

黃 木香 沈香 大黃 牽牛 一兩 半夏 三銖 木通

草 三銖若狂言
惡口用一兩

右先將牽牛半夏二味為末作一處入硝石同研令

勻所餘衆藥只合作一處搗羅為末每服五錢衆藥末三錢以水一盞半生薑三片葱三枝候湯沸方入薑并藥味煎一沸急瀉出取汁一盞用調牽牛半夏等末二錢食後和滓服

金屑丸 治傷風寒頭痛肌熱大效

大天南星

五箇

半夏

二兩洗七遍

石膏

二兩

甘草

半兩

鬱金

一兩

右為末以生薑自然汁為丸如鷄頭大每服二丸傷寒頭痛荊芥茶湯下四肢厥冷燈焰上燒存性四

分服大便不通大戟湯下小便不通大黃湯下破傷風豆淋酒下常服茶清下並嚼嚥

神朮散 治傷風寒濕頭昏鼻塞咳嗽四肢疼痛不喜飲食

刮皮蒼朮

四兩

川芎

細辛

去葉半兩

藁本

去蘆各一兩半

羌活

去蘆

甘草

一兩半炙

右為細末每服二錢水一盞煎七分空心熱服

治傷寒頭疼渾身痛脚手厥冷陰症者方可服

桂心 附子 椒 白朮

各一錢

豉 葱白

二莖

右以水一升酒半升煮藥取半升分作二服服了蓋覆卧取汗一服愈如未瘥加生薑煎一分服不拘時候

防風湯

防風

二兩去蘆頭

芍藥

二兩

羌活

一兩

熟地黄

二兩切焙

甘草

一兩

半

右為麤末每服四錢以水一盞半生薑五片同煎七

分去滓溫服日三服夜一服取瘥為度

羌活湯

羌活一兩獨活一兩芍藥二兩白朮二兩甘草半兩

右為麤散每服四錢以水一盞半生薑五片同煎至

七分去滓溫服不計時候

治傷寒頭疼并太陽頭疼及一切頭風

川芎一兩細辛半兩香附子一兩羌活一兩甘草三錢白芷二兩

甘菊一兩蒼朮一兩薄荷一兩荆芥四分茵陳五分

右為末每服二錢茶清調下婦人產後傷風頭痛用
當歸末石膏末同調下

解傷寒頭痛

右以升麻一兩細剉水一升煎煉取濃汁服之

療傷寒熱頭痛心下煩滿

柴胡 茯苓 桔梗 大黃 石膏 麻子仁

甘草 桂

各等分

右為散以水一斗煮取四升入硝石三分方寸匕服

傷寒食毒論

夫傷寒食毒者由其人脾胃氣弱宿食不化因外傷風冷四肢不利身體雖不大熱心胃恒多壅悶吐逆上氣心腹脹滿小便赤色下利頻併診其脈緊數三部俱有此候乃其症也 又云傷寒兼食毒者此世所謂夾食傷寒也甲乙經曰邪生陽者得之風雨寒暑邪中於陰者得之飲食居處陰陽喜怒此病本由動勞汗出飲食失節又傷冷食寒飲所致內外挾寒其狀微熱惡寒心胃

痞悶四肢痠疼頭痛吐逆上氣腹滿小便赤色泄利頻
併宜先治其裏

方

人參散 治食毒傷寒初得病身體不大熱心悶吐逆
上氣小便赤色下利不止水穀不化

人參

去蘆頭
一兩

赤茯苓

二分

高良薑

半兩
剉

草豆蔻

半兩
去皮

附子

半兩炮製
去皮臍

陳橘皮

半兩湯浸
去白穰焙

細辛

一分

甘草

一分

炙微
赤判

子芩

三分

訶梨勒皮

半兩

厚朴

半兩去粗皮塗生
姜汁炙令香熟

右搗細羅為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至五分去生薑不計時候和滓稍熟服

治食毒傷寒頭痛身不大熱心間駐悶大便下利宜服此方

乾薑

半兩炮製

附子

三分炮製去皮臍

甘草

半兩炙微赤剉

訶梨勒

皮陳橘皮

半兩湯浸去白穢焙

厚朴

三分去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右搗細羅為散每服二錢水一中盞煎至五分不拘

時候和滓溫服

大腹皮散 治食毒傷寒心腹脹滿時復嘔吐增寒不

下飲食大小便閉澀

大腹皮

一兩 剉

川大黃

一兩 剉碎 微炒 聖濟醋炒

木香

半兩 桂心 兩

白朮

一分

川朴硝

一兩 聖濟用半兩

厚朴

三分 去粗皮 塗生薑汁 炙令香熟

右搗篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服一方無生薑名大腹皮

湯

桂心散

出聖惠方

治傷寒食毒腹脹氣短壅悶不下食四肢

少力

桂心

當歸

劉微炒

大腹皮

劉微

訶梨勒

煨用皮

川大黃

劉碎微炒

木香

已上各一兩

枳殼

三分麩炒微黃去核

甘草

三分炙微赤劉

右搗篩為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服

木香散

出聖惠方

治傷寒食毒脾胃虛乏四肢少力不思飲

食心腹氣脹或時下利向晚增寒

木香

半兩

草豆蔻

半兩去皮

桂心

半兩

陳橘皮

半兩湯浸去白穢焙

白

木

兩

神麴

一分

微炒黃色

聖濟用半兩

華撥

兩

人參

三分

夫蘆

頭聖濟用

兩

甘草

半兩

炙

柴胡

半兩

去苗

桃仁

三分

湯浸去皮尖

雙仁麴炒微黃

厚朴

三分

去粗皮

塗生薑汁

炙令香熟

聖濟用半兩

右搗篩為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候稍熱服

檳榔散

出聖惠方

治傷寒食毒腹脹喘急

檳榔

一兩

白朮

一兩

木香

三分

人參

一兩

去

訶梨勒皮

三分

陳橘皮

一兩

湯浸

右搗細羅為散每服二錢水一中盞入生薑半分棗

三枚煎至五分去滓薑棗不計時候和滓溫服

白朮散

出聖惠方

治傷寒食毒壯熱頭疼時復增寒四肢痠

痛口苦

白朮

三分

附子

三分炮製去皮臍

乾薑

半兩炮製剉

桂心

三分

甘草

半兩炙微赤剉

川大黃

三分剉碎微炒

木香

半兩

枳殼

半兩麩炒微黃去穢

右搗細羅為散每服二錢水一中盞入生薑半分棗

三枚煎至五分去滓薑棗不計時候溫服

赤茯苓散

出聖惠方

治傷寒食毒腹脹虛鳴不能食

赤茯苓

陳橘皮

湯浸去白穢焙

人參

去蘆頭

白朮

五味

子木香

桔梗

去蘆頭

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙令香熟各一兩

右搗細篩為散每服二錢以水一中盞生薑半分煎至五分去薑不計時候和滓溫服

治傷寒食毒心腹脹氣急悶大小便不通宜服此方

川大黃

一兩剉碎微炒

赤芍藥

一兩剉碎微炒

當歸

半兩去尾焙

木香

半兩剉碎微炒

朴硝

一兩剉碎

枳殼

半兩起炒微黃去穢

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分去滓無時溫服以利為度聖濟無枳殼名朴

硝湯

木香丸

出聖惠方

治食毒傷寒心腹脹滿頭面遍身俱黃或

時增寒壯熱吐逆不下飲食大便閉澀小便如血

木香

一兩

桂心

川升麻

一兩

白朮

半兩

川大黃

一兩

剉碎微炒

知母

半兩

厚朴

一兩

去粗皮塗生薑汁炙令香熟

檳榔

一兩

川朴硝

一兩

右搗羅為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每

服不計時候以生薑湯下三十丸

人參湯

出聖濟總錄

治傷寒食毒初得病身體不大熱心胃

痞悶不思飲食吐逆不定上氣築心下利不止水穀

不化

人參

一兩

赤茯苓

去黑皮

黃芩

去黑心各三分

訶梨勒

炮去核

高

良薑

劉炒

厚朴

去粗皮生薑汁炙劉

陳橘皮

去白炒

甘草

炙劉

草豆

薤

去皮

附子

炮製去皮臍各半兩

乾薑

炮

細辛

去苗葉各一分

右咬咀如麻豆大每服三錢以水一盞生薑三片煎

至七分去滓溫服以粥飲投取汗

芎藭湯

出聖濟
總錄

治傷寒食毒壯熱頭疼時復憎寒四肢

疲痛口苦

芎藭

附子

炮製去
皮臍

大黃

劉
妙桂 去粗皮
各三分

乾薑

炮甘

草

炙

木香

各半
兩

右咬咀如麻豆大每服三錢以水一盞生薑三片棗

一枚擘煎至六分去滓空心溫服

續命丸

出聖濟
總錄

治傷寒食毒水癖不消及痰實

大黃

劉醋炒

黃芩

去黑心

麻黃

去根節

黃連

去鬚各半兩

豉

半

炒

甘遂

半分炮

梔子仁

朴硝

研

杏仁

去皮尖雙仁炒研各一分

巴豆

一分去皮心膜研以紙壓去油

右搗羅七味為末與三味研者拌勻煉蜜和丸如大

麻子大每服三丸空心溫熱水下以利為度未利

加一二丸

大黃湯 治傷寒食毒心腹脹滿時復嘔吐憎寒不下

食大小便秘澀

大黃

剉炒

白朮

厚朴

去粗皮生薑汁炙剉

大腹皮

剉各一兩

木香

桂

去粗皮

朴硝

研

牽牛子

炒各半兩

右麤搗篩每服二錢以水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服不拘時候

疎氣湯

治傷寒後食毒所傷心腹脹滿水穀不化大

便不利

京三稜

煨剉

牽牛子

炒各一兩

乾薑

炮半兩

陳橘皮

去白炒一兩

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九不

拘時生薑湯下取利為度未利再服

檳榔散 治傷寒食毒所傷腹脹氣急大小便不通

檳榔

剉

郁李仁

去皮各一兩

大腹皮

剉

陳橘皮

湯浸去白炒各

半兩

右搥羅為散每服二錢以生薑湯調下

橘皮丸 治傷寒食毒惡寒腹脇急脹嘔吐不下食手

足厥冷

陳橘皮

去白炒

草豆蔻

去皮

桂皮

去粗

枳殼

去穢炒

木香

各一

兩
大黃

剉炒
二兩

鼈甲

去裙襴一兩半
用醋五合浸炙

硃砂

一分
研

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二九空心

生薑湯下

乾薑湯

治傷寒食毒頭痛惡寒心腹虛脹大便泄利

乾薑

炮

甘草

炙剉各
半兩

附子

炮製去
皮臍

陳橘皮

去白
炒

厚

朴

去粗皮生薑
汁炙各三分

右剉如麻豆每服三錢以水一盞煎至七分去滓食

前溫服

茯苓湯 治傷寒食毒腹脹虛鳴不能食

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

去白炒

人參

白朮

木香

炮

厚朴

去粗皮生薑汁炙剉

五味子

各一兩

乾薑

炮半兩

右麤搗篩每服三錢以水一盞生薑三片煎至六分

去滓空心溫服

芍藥湯 治傷寒食毒心腹脹滿或時泄利

芍藥

白朮

厚朴

去粗皮生薑汁炙各一兩

白豆蔻

去粗皮

皮 乾薑

炮

甘草

炙剉各半兩

木香

三分

右麤搗篩每服三錢以水一盞生薑三片煎至六分

去滓食前溫服

草澄茄丸 治傷寒食毒心胸痞悶泄利頻併

草澄茄

一兩

乾薑

炮三分

陳橘皮

湯浸去白焙一兩

桂

去粗皮三分

厚朴

去粗皮生薑汁炙一兩

阿魏

半兩

肉豆蔻

去皮三枚

縮砂

去皮半兩

草豆蔻

去皮三枚

甘草

炙三分

附子

炮製去皮臍一兩

草撥

一分

白

木

半兩

右搗羅為末煉蜜為丸如梧桐子大每日空心酒下

十九至二十九以知為度

麴桂湯 治傷寒食毒咳嗽

陳麴

劉桂皮去粗

百合

麻黃

去根

黃連

去鬚枳殼

麴

白石脂

各一兩半

桑根白皮

炒

地骨皮

附子

炮製去皮

脂各二兩

款冬花

羚羊角屑

旋復花

微炒各一兩

黃芩


去黑心

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒十枚

右搗麴篩每服五錢以水一盞半入生薑三片同煎

至八分去滓溫服



普濟方卷一百三十六

欽定四庫全書

子部
普濟方卷一百三十八

詳校官太醫院醫官_注姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官中書臣王鍾泰

謄錄監生臣崔鶴立

欽定四庫全書

普濟方卷一百三十七

明

周王朱橚撰

傷寒門

傷寒發狂

夫傷寒心狂熱者緣心屬火也心主於血陰陽盛則血并於陽熱邪攻於心絡則心神煩亂或默或歌或言或笑猖狂不已言語失常驚悸不安棄衣而走此皆熱毒之氣壅滿心胸致令發狂也夫重陽者狂謂陽氣獨盛

也傷寒熱毒既盛內外皆熱則陽氣憤噴而發為狂越其病使人狂走妄言或罵詈不避親疎或妄見妄聞甚則至於棄衣而走登高而歌或數日不食踰垣上屋者蓋四肢諸陽之本也熱盛而四肢實是為重陽故所止處皆非素所能而病乃能也若乃因火為邪而發為驚狂及內有瘀血而外症如狂其為病雖不同然其為陽氣有餘則一也傷寒發狂者狂猖狂也謂其不寧也難經曰狂之始發也少卧不饑而自高賢也自辨智自

貴倨也妄笑好歌樂也妄行走不休也狂家所起皆陽
盛使然內經曰乃陰不勝陽也脈留薄疾并乃狂也又
曰邪入於陽則狂邪入於陰則瘖難經曰重陽者狂重
陰者癲脈經曰陰附陽則狂陰附陰則癲病源曰陽邪
併於陽則狂陰邪併於陰則癲即諸經之狂為陽盛也
明矣又陽明之病惡人與火聞木音則惕然而驚心欲
動獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走踰垣上
屋其所上之處皆非素能也是謂陽邪併於陽明也傷

寒熱毒在胃併於心臟使神不寧而志不定遂發狂也
傷寒至於發狂為邪熱至極也非大吐下則不能已又
有熱在下焦其人如狂者經曰熱入膀胱其人如狂謂
之如狂則未至於狂但卧起不安爾其或狂言目反直
視為腎之絕汗出輒復熱狂也不能言食又為失志病
若此則殆非藥石之所及是為甚病焉 活人歌括曰
發狂面赤屬重陽葶藶升麻及大黃血症身黃仍漱水
尿多承氣地黃湯陰邪併於陰則癰陽邪併於陽則狂

傷寒熱毒在胃併入於心遂使神志昏亂言動急速而發狂也狂之發作少卧不饑妄語妄笑妄倨妄辨妄起妄行棄衣而起登高而歌甚則踰垣上屋皆獨陽亢熱使之非吐下不能止有當汗不汗瘀熱在裏下焦血虛面如狂者小便必利特如狂而未至於狂耳其或熏熨迫汗灼艾熱燒針令人煩躁卧起不安則謂之火邪驚狂凡是數者各有條例若夫狂言直視旋溺自遺其與汗後熱多脈躁狂言不食胃有寒水重陽結毒脈數實

狂走錯語煩躁乾嘔面赤咽痛朝熱發班莖薤苦酒湯
陽毒升麻湯梔子仁湯三黃湯大黃散升麻葛根湯如
大狂走者水調瓜蒂末吐痰瓜蒂散亦可吐血症如狂
脈微而沈身黃唇燥漱水不欲下嘔無寒熱小腹鞭滿
小便利大便微利而黑輕者犀角地黃湯重者楊桃仁
承氣湯或抵當丸取盡黑物為效張云太陽病不解熱
結膀胱其人如狂而血自下下者愈若外不解可與桂
枝湯外已解但小腹急結乃以桃仁承氣湯攻之大抵

傷寒當汗不汗熱畜在裏熱化為血故喜怒如狂陽狂
寒水石黃連末各一錢冷水調下皆效發熱妄語未可
下者龍膽草一物湯火邪驚狂者醫家以火熏熨迫汗
及燒針灼艾而然也其人亡陽煩躁卧起不安金匱風
引湯柴胡加龍骨牡蠣湯桂枝甘草龍骨牡蠣湯又以
火劫腹滿微喘口乾咽爛或大便不通譫語小柴胡湯
黑豆解火邪湯

方

龍骨救逆湯

出聖惠方

治傷寒脈浮醫以火劫出汗太過必亡

陽心生狂熱起卧不安

龍骨

一兩

桂心

一兩

甘草

一兩炙微赤剉

茯神

一兩

人參

一兩去蘆頭

麥門冬

二兩去心焙

牡蠣

二兩燒為粉

蜀漆

一兩

右搗麤羅為末每服四錢水一中盞入生薑半分棗

三枚煎至六分去滓不計時候溫服

犀角散

治傷寒有狂熱在心恍惚或多驚不得睡卧

犀角屑

三分

茵陳

三分

茯神

二兩

人參

一兩去蘆頭

梔子仁

半兩

赤芍藥

半兩

麥門冬

一兩 去心焙

龍齒

三分

川升麻

半兩

子芩

三分
甘草

微赤剉

右搗篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服

桃仁承氣湯

出聖惠方

治傷寒病不解熱結在膀胱者其人

必如狂血自下愈外未解出不可下先解其外解已
但小腹結者可下之宜服內經曰甘以緩之辛以散
之小腹急結緩以桃仁之甘下焦畜血散以桂枝之

辛大熱之氣寒以取之熱甚搏血加二物於調胃承

氣湯之中也

方見本門三陰
三陽應用散類

羚羊角散

出聖
惠方

治傷寒心熱發狂

羚羊角屑

半兩

黃芩

半兩

赤芍藥

半兩

茯苓

半兩

葛根

半兩
剉

鼠尾草

半兩

梔子仁

半兩

川大黃

半兩

麥門冬

半兩

去心

剉
微炒

焙

右揔篩麤羅為散每服四錢以水一中盞入豉一百粒

煎至六分去滓不計時候溫服

人參散

出理
惠方

治傷寒邪熱在心恍惚狂言時有痰逆不

欲飲食

人參

三分去
蘆頭

桔梗

半兩去
蘆頭

龍齒

三分

茯神

三分

半夏

半兩

湯洗
七遍去滑

遠志

一分
去心

枳實

一分麩
炒微黃

麥門冬

三分
去心

沙參

半兩去
蘆頭

黃耆

半兩
剉

甘草

一分炙
微赤剉

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三

枚粳米五十粒煎至五分去滓不計時候溫服

地骨皮散

出理
惠方

治傷寒心神煩熱狂語不定

地骨皮

萎蕤

人參

去蘆頭

黃耆

剉

麥門冬

去心

子

苓

已上各一兩

茯神

三分

甘草

半兩炙微赤剉

右搗篩為散每服四錢水一中盞煎至五分去滓入

生地黄汁一合生薑汁一茶匙蜜半合更煎一兩

沸不計時候溫服

龍齒散

出聖惠方

治傷寒心熱狂言恍惚卧不安席

龍齒

二兩

犀角屑

一兩

川升麻

一兩

茯神

一兩

麥門冬

二兩

去心焙

玄參

一兩

甜竹根

三分剉

赤芍藥

一兩半

生乾地黄

二
馬牙硝 一兩

兩

右搗麤羅為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎

至六分去滓不計時候溫服

又方

出聖
患方

馬牙硝

一兩

鉛霜

一分

龍腦

一分

硃砂

半兩

鐵粉

一兩

右都研令細不計時候煎竹葉湯放溫調下一錢

又方

出聖
患方

龍齒

半兩

牛黃

一分

馬牙硝

一兩

硃砂

半兩

地龍

一兩

微 麝香 一兩 炒 細研

右搗研令勻不計時候以生薑蜜調下一錢

黃芩散

出聖惠方

治傷寒熱毒在內心煩發狂

黃芩

一兩

甘草

半兩炙微赤剉

白薇

一兩

梔子仁

一兩

大青

知

母

蘇蘇

川硝石

白鮮皮

各一兩

右搗羅為散每服不計時候以新汲水調下二錢

龍齒丸

治傷寒邪熱在心狂言妄語精神錯亂志意

不定

龍齒

一兩

人參

一兩去
蘆頭

茯神

三分

遠志

半兩
去心

黃芩

三分

麥

門冬

一兩去
心焙

黃連

三分
去鬚

甘草

半兩炙
微赤剉

右搗羅為末煉蜜和搗一二百杵如梧桐子大每服

不計時候以冷米泔水三十丸送下

苦參飲

出聖濟
總錄

治傷寒欲發狂解毒止躁

苦參

一兩

黃芩

去黑心
二兩

甘草

炙半
兩

右搗為麤末每服三錢以水一盞煎至七分去滓入

生地黃汁約半合攪勻去滓溫服不拘時候

大黃湯

出聖濟總錄

治傷寒熱結在內心神恍惚狂妄

大黃

判炒

芒硝

各一兩半

桂

去粗皮三分

大腹皮

判

甘草

炙

木

通

判各一兩

桃仁

二十一枚去皮尖雙仁麤炒

右麤搗篩每服四錢以水一盞煎至六分去滓溫服

不計時候以通利為度

犀角湯

出聖濟總錄

治傷寒九日至十日頭戰大汗出恍惚

狂走眼見神鬼

犀角屑

半兩

茵陳蒿

三分

茯苓

去木

芍藥

麥門冬

去心焙

生乾地黄

焙各一兩半

梔子仁

兩半

右麤搗篩每服五錢用水一盞半入竹葉三七片同

煎至八分去滓食後溫服

千金丸

出聖濟總錄

治陽毒發狂及癰邪狂走

猪血

一盞生用

不灰木

為末

藍根

連葉為末各一兩

水銀

一盞以錫結沙

子

鷄子

三枚只用清

膩粉

半錢

右六味除猪血鷄子清外細研入猪血鷄清拌和令

勻入瓷罐子內封閉臘日合之掘地坑一尺埋候

端午日取出旋丸如鷄頭大每服一九生薑汁及

新汲水化破服

救逆湯

出聖濟總錄

治傷寒脈浮醫以火劫之亡陽必驚狂

桂

去粗皮

蜀漆

各一兩半

甘草

炙一兩

牡蠣

熬二兩半

龍骨

二兩

右剉如麻豆大每服五錢以水一盞半入生薑半分

切大棗二枚擘破同煎取七分去滓溫服

人參湯

出聖濟總錄

治傷寒後狂言欲走口乾或時吐逆

人參

羚羊角屑

葛根

剉

竹茹

前胡

去蘆頭

麥

門冬

去心焙
各半兩

甘草

炙判
一兩

半夏

湯浸去滑
炒乾半兩

右麤搥篩每服五錢以水一盞半入生薑一分拍碎

棗三枚擘破同煎至八分去滓食後溫服

此胡湯

一名加味
小柴胡湯

治傷寒過經不解熱結在裏狂言不

定煩躁欲走

此胡

去苗

大黃

判炒

朴硝

枳殼

去穢麤炒
各一兩

甘草

炙判
半兩

右麤搥篩每服三錢以水一盞煎取六分去滓溫服

利再服一方加枳實一錢半

羚羊角散

出聖濟總錄

治傷寒發汗後熱毒未盡因有所驚

狂言欲走

羚羊角屑

犀角屑

防風

去叉

茯苓

去木

黃芩

去黑心

玄參

升麻

龍齒

研一兩

甘草

炙一兩

竹茹

地

骨皮

洗焙

丹參

各三分

右麤搗篩每服五錢用水一盞半入葱白五寸同煎

至八分去滓溫服

香豉湯

出聖濟總錄

治傷寒心狂欲走緣風熱毒氣內乘於

心所致

鼓

炒令香
熟三兩

芒硝

燒令白於濕地上用
紙襯出火毒四兩

右二味每取鼓半兩先以水一盞煎取七分去滓下
芒硝末三錢再煎三兩沸空腹分溫二服如人行
三里更一服日夜可四服起初者是風狂者宜暫
經兩手足三服之後解之即無不愈者

朴硝湯

出聖濟
總錄

治傷寒發狂欲走是毒氣壅於上焦毒

熱不散狂盛不縛手脚恐自刑害及走起人其脈左

寸洪數時時伏下

朴硝

燒令白於濕地用紙襯出火毒一分

豉

炒令香熟一合

山梔子仁

一分

右麤搗篩每服三錢以水一盞煎至半盞去滓空腹

溫服如人行十里再一服如利即止

大黃湯

出聖濟總錄

治傷寒狂言欲走大小便不通腹痛脹

滿

大黃

細判微炒

木香

判各一分

木通

判三分

升麻

羚羊角屑

白茅根

判

黃芩

去黑心各半兩

右麤搗篩每服五錢用水一盞半入葱白五寸同煎
至八分去滓服

鬱金散

出聖濟
總錄

治傷寒陽盛發狂大小便不通腹脹滿

鬱金

大黃

細剉
微炒

山梔子仁

各三
分

桂

去粗皮
半兩

甘草

灸剉

一分

右搗羅為細末每服二錢食後煎葱豉湯調下

治傷寒得汗熱毒不解心煩躁悶言語不定小便赤澀

大便不通狂悶欲走方

出聖濟
總錄

大黃

細判 微炒

朴硝

研各二兩

黃芩

去黑心

山梔子仁

大青

各一兩半

龍膽

去土

苦參

各一兩

右搗羅為細末煉蜜和成劑更搗三五百杵如梧桐

子大每服二十九食後煎麥門冬湯下量病勢更

加丸數

金薄丸

出聖濟總錄

治傷寒時行發狂妄見鬼神

金箔

銀箔

各一片

鐵落

用水淘出沙泥取鐵粉四兩

青黛

半兩

霜

半錢

麝香

半錢

右研為細末入糯米粥為丸如皂莢子大新水磨下一丸如人行五里吐出涎立效

不灰木散

出聖濟總錄

治傷寒熱實發狂煩躁悶亂

不灰木

二兩

滑石

寒水石

藍根

甘草

生各一兩

右搗研為散每服二錢研生粟米泔入乳糖一塊如棗大同化調服不拘時候

絳雪丸

出聖濟總錄

治傷寒發狂眼通赤大小便血出身如

金色兼治六七日狂躁發熱

硝石

一兩

丹砂

一分

右二味同研如粉燒粟米飯和丸如彈子大每服一

丸沙糖冷水化下服藥後便睡移時汗出為效

鵲石散

出醫方集成

治傷寒發狂踰牆上屋

黃連 寒水石

各等分

右為末每服二錢濃煎甘草湯候冷調服

一方

出肘後方

治傷寒發熱陽勝陰卒發狂手足溫面紅狂

言狀如見鬼

右用青蒿一把搥碎為末入水二盞半送下立效一方老青松蒿子童便浸三日乾為末每服二錢烏

梅一箇煎服

桂白丹

出宣明論

治傷寒積熱及風生驚搐或如狂病諸藥

不效此方不可盡述

粉霜

一兩用白麴六錢和作餅子炙熱同研

鉛白霜

一分輕粉半兩

右為末滴水為丸桐子大每服十九至十五丸米飲下量虛實加減

金匱風引湯

出活人書

大黃 乾薑

龍骨

各四兩

桂枝

三兩

甘草

牡蠣

各二兩

兩 寒水石

滑石

赤石脂

白石脂

石膏

紫石英

各六兩

右為麤末以囊盛之取三指撮井花水三升煮二沸

去滓溫服一升

桃仁散

出王氏博濟方

治傷寒狂亂疎利臟腑止霍亂心疼

桃仁

一兩湯浸去皮尖

大黃

一兩川者以濕紙裹煨兩度

桂心

一兩去皮

甘

草

半兩
大

牙硝

一兩

右細剉熟炒杵羅為末不拘時候用溫水調下三錢

如傷寒後有餘毒依法服大效

傷寒潮熱

論

夫傷寒熱毒不退伏留於臟腑而不能散即攻其表隨氣旺衰而作發歇遍身壯熱或進或退故謂之潮熱也診其脈各隨其五臟六腑洪數者是也傷寒潮熱者謂潮作有時由邪氣入裏故病有日晡所發潮熱已而微

利者有微發潮熱而大便溏者有潮熱而欬逆者有結胸而潮熱者大凡潮熱皆以邪氣內實也制方者宜酌其輕重傷寒潮熱者若潮水之潮其來不失其時也一日一發指時而發者謂之潮熱若日三五發者即是發熱非潮熱也潮熱屬陽明必於日晡時發者方為潮熱陽明者胃屬土應時則旺於四季應日則發於未申經曰陽明居中土也萬物所歸無所復博蓋邪氣入胃謂之入府府之為聚也若府庫之府焉邪氣入於胃而不

復博邪氣鬱而為實熱隨旺而潮是以日晡所發潮熱者屬陽明也惟其屬陽明故潮熱為可下之症經曰潮熱者實也又曰潮熱者此外欲解也可攻其裏焉又曰其熱不潮未可與承氣湯即此觀之潮熱屬於胃者昭然可見焉雖然潮熱為裏實可下之症一或脈浮而緊與其潮熱而利或小便難大便溏者皆熱未全入府猶帶表邪當和解其外外解已而小便利大便硬者乃可攻之或謂潮熱有屬太陽少陽者乎少陽正於寅卯太

陽旺於巳午若熱於此發者為邪未入胃豈得謂之潮熱必待日晡所發者乃謂之潮熱見其邪在胃也遇疾值病詳而驗之始見得真也 潮熱者大率當下仲景

云潮熱者實也大承氣湯症云其熱不潮未可與也則知潮熱當下無疑矣雖然更有脈與外症脈若弦若濡及外症兼惡寒猶有表症且與小柴胡湯以解之若腹大滿不通者可與小承氣微和其胃氣勿令大泄也

仲景

云日晡發熱者屬陽明也脈實者大承氣大柴胡也脈虛者桂枝也縱使潮熱當得大承

氣亦須先少與小承氣若不轉失氣不可攻之後發熱復硬者大柴胡下之若胸脇滿而嘔日晡發潮熱者小柴胡加芒硝主之又有日晡發潮熱已而微利者又有微發潮熱而大便澹者或潮熱而欬逆者皆當用小柴胡也

傷寒十三日不解胃脅滿而嘔日晡發潮熱已而微利潮熱者實澹也先服小柴胡以解外後以柴

胡加芒硝湯下之陽明潮熱大便少胸滿不去者柴胡主之

冬陽明潮熱當行黃芩

湯冬陽明病脈浮而緊必發潮汗黃芩熱發作有時但脈浮者必盜主之

已上潮熱並屬

陽明也太陽有潮熱仲景大陷胃湯一症結胸有潮熱

者為大結胃屬太陽也傷寒若吐若下後不解不大便
五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見
鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直
視但發熱譫語者大承氣湯主之若一服利則止後脈
弦者生濇者死

弦者陽也濇者陰也陽症見陰者死
病人有陽症而脈濇者慎不可下

歌

曰已成下症熱須潮病在陽明裏欲焦若有結胸并表
症莫將承氣胃中調又歌曰潮熱屬胃下之和大結
胸家本利圖欬逆利瀉并表症勿攻只有小柴胡潮熱

屬陽明一日一發日晡而作也若非日晡而發是謂其熱不潮蓋陽明旺於未申故爾惟屬陽明故潮熱為可下之症苟其脈或弦或浮大便或澹或利小便艱澀外症猶有惡寒則結其熱未全入府並不可下但以小柴胡和解之是必表症已退大便硬而小便如常乃可攻也日晡潮熱甚者循衣摸牀獨語如慳直視微喘鬪弦者可治脈濇者不治脈不實不虛但有小柴胡湯寒熱往來陰陽相搏用大小柴胡及桂薑結熱心煩仍喜嘔渴

而頭汗用之良陽不足先寒而後熱陰不足則先熱而後寒往來者陰陽兩相勝邪正交爭間作也蓋裏而與之爭故陽勝而為熱若邪氣在半表半裏之間則外大邪入於內為寒陰爭而為熱出入無拘所以乍往乍來而間作也大抵邪居表多則多寒邪居裏多則多熱邪在半表半裏則寒熱相半又可以知其受病之處用藥固自有條然小柴胡最主寒熱寒多者加薑桂若熱結加大黃脈不甚實而大便澀者加枳實寒熱相半只

守本方是活法雖然寒熱之方來如波濤之洶湧其勢
有不容通者當進之一二日候少定而圖之經所謂盛
者可待衰而已是又不可不知病至十餘日結熱在裏
往來寒熱大柴胡湯下之心煩喜嘔胸脇滿不欲食寒
熱往來小柴胡湯或血氣弱腠理開邪氣交爭痰嘔甚
者二陳湯汗下後不嘔而渴頭汗出胸脇滿小便不利
寒熱往來柴胡桂薑湯

方

鼈甲散

出聖惠方

治傷寒發歇潮熱頭痛煩渴四肢無力胸

膈痰滯不思飲食

鼈甲

一兩半去裙生用

恒山

三分剉

甘草

半兩炙微赤剉

川大黃

半兩

剉碎微

赤炒

地骨皮

一兩

石膏

二兩

麥門冬

一兩去心

知母

半兩

右搗篩為散每服三錢水一中盞入小麥五十粒煎

至五分去滓不計時候溫服

人參散

小聖惠方

治傷寒潮熱不退每發口乾渴逆飲食全

少四肢無力

人參

一兩去蘆頭

半夏

半兩湯洗七遍去滑

蘆根

一兩

麥門冬

半兩

去心枳實

半兩麩炒微黃

黃耆

三分劉

赤芍藥

白朮

赤茯苓

苓 甘草

炙微赤劉各半兩

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三

枚粳米五十粒煎至五分去滓不計時候

麥門冬散

出聖惠方

治傷寒潮熱往來口乾煩燥頭目疼痛

麥門冬

二兩去心焙

葛根

一兩劉

麻黃

三分去根節

黃芩

川

大黃

劉碎微炒

川朴硝

各三分

右細羅為散不計時候用新汲水調下一錢

葛根散

出聖惠方

治傷寒潮熱口乾頭痛四肢煩疼

葛根

剉

黃芩

石膏

柴胡

去苗

知母

各一兩

甘草

半兩

炙微

赤剉

右搗篩為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

柴胡散

一名柴胡桂姜湯出聖惠方

治傷寒經十日已上潮熱不解

日晡即發壯熱如火胸滿嘔逆亦治勞瘡

柴胡

一兩
去苗

桂心

半兩

黃芩

三分

蘇蘇根

半兩

牡蠣

一兩
燒為粉

甘草

一分
炙微赤對

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候溫服聖濟名六味柴胡湯外

臺秘要用乾薑無生薑

黃芩散

出聖惠方

治傷寒潮熱煩悶體痛嘔逆

黃芩

柴胡

去苗

人參

去蘆頭

半夏

湯洗七遍去滑各三分

甘草

半兩炙

微赤對

麥門冬

一兩
去心

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

秦朮散

出聖惠方

治傷寒潮熱不退發歇無時

秦朮

一兩去苗

鼈甲

一兩去裙襴塗醋炙令黃

甘草

半兩炙微赤判

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分豉半合葱白二莖煎至五分去滓不計時候溫服聖濟名秦朮湯

知母散

出聖惠方

治傷寒數日潮熱不退口乾煩燥或多痰

逆

知母

人參

去蘆頭

柴胡

去苗

石膏

葛根

剉

赤茯苓

已上各

一兩

甘草

半兩微炙赤剉

右搥篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服聖濟名柴胡人參湯及治汗下後潮熱

百合散

出聖惠方

治傷寒已經二七日外潮熱不退四肢無

力昏沈如醉恐變成百合病

百合

葛根

各一兩

麻黃

去根節

麥門冬

去心

黃芩

各半兩

前胡

三分去蘆頭

石膏

一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服

石膏散

出聖惠方

治傷寒心胸壅悶潮熱頭痛肢節拘急

石膏

一兩

前胡

去蘆頭

柴胡

去苗

甘菊花

赤茯苓

芍藥

防風

去蘆頭

蔓荊子

黃芩

甘草

炙微赤剉

枳

殼

麤炒微黃去根各三分

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服

萎蕤散

出聖惠方

治傷寒數日頭痛潮熱不退或發憎寒

萎蕤

柴胡

去苗各一兩

羚羊角屑

三分

石膏

二兩

桑根白

皮

剉

川朴硝

各一兩

右搗篩為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

羚羊角散

出聖惠方

治傷寒潮熱頭痛四肢拘急煩疼

羚羊角屑

赤茯苓

麥門冬

去心

姜薤

柴胡

去苗

梔子仁

已上各一兩

桑根白皮

三分剉

石膏

二兩

甘草

半兩炙微

赤剉

右搗篩為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

龍膽丸

治傷寒潮熱不退四肢沈重不欲飲食胸中

塞隘小便赤澀

龍膽

一兩去蘆頭

前胡

三分去蘆頭

白蘚皮

一兩

黃連

三分去鬚

子

芩

半兩

梔子仁

三分

川大黃

一兩半
剉微炒

川升麻

三分

大麻仁

一兩半別

鼈甲

去裙襖塗醋
炙令微黃

川芒硝

各一兩

研如膏

右搗羅為細末入麻仁同研令勻煉蜜和搗三二百

杵丸如桐子大每服不計時候以溫漿水下三十

丸

柴胡厚朴湯

出聖濟
總錄

治傷寒後潮熱不退或時頭痛目

眩此是腹中有結燥

柴胡

去苗

厚朴

去粗皮
姜汁炙

朴硝

研各一兩

大黃

剉炒一兩半

枳殼

去穢麤

炒三分

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服

以利為度

柴胡石膏湯

出聖濟總錄

治傷寒十日已上潮熱不退

柴胡

去苗

石膏

碎

赤茯苓

去黑皮

白朮

姜蕤

羚羊

角

銹各一兩

梔子仁

一分

桑根白皮

剉三分

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服

前胡湯

出聖濟總錄

治傷寒差後已經十餘日潮熱不退身

體沈重昏昏如醉

前胡

去蘆頭

百合

葛根

剉各一兩

麥門冬

去心焙半兩

石膏

碎

麻黃

去根節各三分

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

柴胡鼈甲湯

出聖濟總錄

治傷寒過經潮熱不解或時作寒

如瘡狀

柴胡

去苗鼈甲

去裙襖醋炙

赤茯苓

去黑皮各一兩

黃芩

去黑心

知

母

焙

桑根白皮

剉各三分

甘草

各半兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半生薑半分拍碎煎至

七分去滓溫服不拘時

蒼朮柴胡湯

出聖濟總錄

治傷寒餘毒潮熱不解

蒼朮

去土

柴胡

去苗

知母

焙

青蒿

各一兩

大黃

剉

鼈甲

醋炙

去裙襴

鬼白

常山

各半兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至半盞去滓溫服不

拘時

常山湯

出聖濟總錄

治傷寒潮熱不退

常山

劉三
分

烏梅肉

炒

鼈甲

去裙襖
醋炙

黃耆

劉各
一兩

大黃

劉
炒甘草

炙半
兩

柴胡

去苗
二兩

右麤搗篩每服三錢水一盞半入小麥一匙生薑三

片煎至七分去滓熱服不拘時日三服

治傷寒後不了了朝夕有熱如瘧狀方

一名知母
桂心湯

知母

二兩

麻黃

甘草

芍藥

黃芩

桂心

各一
兩

右㕮咀以水七升煮取二升半服五合日三溫覆令

微汗若心煩不得眠其人欲飲水當稍稍飲之令

胃中和則愈一方用生薑煎服

柴胡湯

出易簡方

治傷寒溫病身熱惡風頭項強急胸滿脇

痛及煩渴嘔噦小便不利大便閉硬或過經未解潮熱有不除非汗非下之症並宜服之及治瘥後勞傷及發熱頭疼或往來寒熱婦人傷寒經血適來或是經血適斷發熱惡寒晝日明了暮則譫語此為熱入血室其血必結故使寒熱如此此藥治之婦人有經事來少日晡發熱大便閉別無虛症者宜用此藥加

大黃減柴胡各等分加桃仁減甘草數各一半服之
微利為效小兒溫熱亦能治療此藥非止治傷寒其
它發熱並宜服之

柴胡

二兩

半夏

黃芩

人參

各三分

甘草

半兩

右咬咀每服五錢水一盞半生薑七片棗一枚煎至
六分去滓食前服若腹痛去黃芩加芍藥半兩心
下悸去黃芩加茯苓一兩若不渴有熱者去人參
加桂三分溫被蓋覆令有汗則解若咳嗽去棗加

五味子三分乾薑半兩胸中煩而不嘔者去半夏
人參加栝蒌實半兩渴者去半夏加栝蒌根一兩
胸中鞭者去棗加煨了牡蠣粉一兩傷寒十三日
不解胸脇滿而嘔日晡則發潮熱已而微利及醫
以丸藥利之非其治也宜芒硝一兩傷寒十餘日
結熱在裏往來寒熱或心下急鬱鬱微煩或舌生
白胎大便不通或發汗出或腹中滿或日晡發熱
如瘧或六七日目中不了了睛不和無表裏症大

便難身微熱者大實也人參枳實半兩大黃一兩
名大柴胡湯服之以利為度熱除不宜遽服補藥
仍忌酒羊肉腰子及難化之物或有所傷是名食
復難以治療飲食須是大段節省不可多食謹忌
兩月仍避房室

治傷寒煩熱

出木
草方

右以烏梅水清飲汁

傷寒心悸

論

夫傷寒悸者謂心下悸動也此由傷寒病發汗已後因又下之內有虛熱發渴渴則飲水氣乘心為寒振而心下悸也太陽病小便不利者為多飲水心下必悸小便少者必苦裏急脉大浮數法當汗出而愈下之則身體重心必悸也不可發其汗當自汗出而解所以然者尺中微裏虛表實津液自和當自汗出愈也 傷寒心下悸者謂悸動不定也傷寒飲水過多水停心下腎氣乘心則心氣虛弱故為之悸動也此皆由發汗已後又下

之津液燥少若内生虛熱熱則飲水水氣停積故心振寒而心下悸也傷寒悸者心忡是也築築踢踢然動怔忡忡不能自安者是矣心悸之由不越二種一者氣虛也二者停飲也傷寒二三日悸而煩者小建中湯主之少陰病四逆其人或悸者四逆散加桂五是氣虛而悸者也飲水多心下悸是停飲而悸者其氣虛者由陽氣內弱心下空虛正氣內動而為悸也其停飲者由水停心下心為火而惡水水既內停心不自安則為悸也

又有汗下之後正氣內虛邪氣交擊而令悸者與氣虛而悸者則又甚焉太陽病發汗過多其人又手自胃必心下悸太陽病若下之身重心下悸者不可發汗少陽病不可吐下吐下則悸而驚少陽病不可發汗發汗則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸是數者皆汗後協邪者與其氣虛而悸者有以異也或鎮固或化散之皆須定其氣浮也又飲水過多水飲不為宣布留心下甚者則悸金匱要畧曰食少飲多水停心下甚者則

悸飲之為悸甚於他邪雖有餘邪必先治悸何者以水
停心下若水氣散則無所不之浸於肺則為喘為咳傳
胃則為噦為噎溢於皮膚則為腫瀆於腸間則為利下
不可緩之也經曰厥而心不悸宜先治水與茯苓甘草
湯後治其厥不爾瀆於胃必作利也厥為邪之深者猶
先治水況其邪氣淺者乎醫者可不深究之 活人書
曰水氣乘心振寒而悸茯苓甘草湯二三日傷寒心悸
煩小建中湯發汗臍下悸欲作奔豚自有本條發汗過

多心下悸欲得按者桂枝甘草湯發汗出仍發熱心下悸身腫動振振欲擗地真武湯脈結代心動悸炙甘草湯少陰不可發汗汗則譫語此屬胃胃不和故悸小柴胡湯中風往來寒熱或心下悸小柴胡湯欲心下悸悸者怔忡也宜先治水茯苓甘草湯次治其厥自有本條又歌曰心悸三陽症自詳冀聖譫語調胃湯胃旋甘桂膠真武小建中兼炙草湯悸多於停水或陽氣向弱心下虛空正氣內動致之或汗下以後正氣內虛邪

氣與之擊搏而然也此蓋心悸而動其與驚陽不同焉
太陽病小便利者以飲水多故心下悸小便少者必勝
胕裏急也並用五苓散小半夏茯苓湯與之陽明病壯
熱往來心下悸小便不利心煩喜嘔小柴胡湯傷風往
來寒熱或心下悸小柴胡湯少陽病脈弦細頭痛發熱
誤汗之必譫語轉屬胃胃和則愈胃不和則煩悸而大
便鞭屬胃調胃承氣湯調胃承氣太峻症治論只用小
柴胡湯冀鞭者可加大黃煩燥者可入芒硝些少凡調

胃症氣症以法伐之尤為穩當太陽發汗過多其人又手自按胃心下悸欲得按者桂枝甘草湯太陽病發汗不解仍發熱心下悸頭眩肌體痠動振振欲擗地者真武湯主之或理中湯加茯苓傷寒二三日心中悸而煩與小建中湯經云先煩而後悸者為熱先悸而後煩者為虛惟虛則小建中主之少陽病耳聾目赤胸滿而煩妄加吐下則悸而驚可與小建中湯如有熱即以小柴胡繼之傷寒脈結代心動悸炙甘草湯少陰四逆症其

人或悸以四逆散加桂主之心下水氣厥而悸當先治水茯苓甘草湯然後治厥有本條不然水入胃必下利矣傷寒多因吐下或火熏或溫針以致驚陽太陽病若下之胸滿煩驚小便不利譫語身重難以轉側用柴胡牡蠣龍骨湯不可發汗汗多則亡陽風溫脈陰陽俱浮妄用火熏以致發黃劇則驚癇時時瘵癰經曰一逆常引日再逆促命期合用金匱風引湯

方

大柴胡湯

出聖惠方

治傷寒二三日心中悸嘔不止心急鬱

鬱微煩者尚未解

柴胡

二兩去苗

黃芩

一兩

赤芍藥

半夏

湯洗七遍去滑

赤茯苓

枳實

麩炒令黃

檳榔

白朮

已上各一兩

右搗麤羅為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗

三枚煎至六分去滓不計時候溫服

白茯苓散

出聖惠方

治傷寒裏虛心下悸腹中氣不和

檳榔

一兩

青橘皮

半兩湯浸去白穰焙

白茯苓

半兩

厚朴

一兩去粗皮塗

生姜汁炙

令香熟

桂心

一兩

甘草

半兩炙
微赤剉

附子

一兩炮製
去皮臍

右搗篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服

人參散

出聖
惠方

治傷寒發汗熱不解心下悸頭眩身潤振

人參

去蘆
頭

赤芍藥

附子

炮製去
皮臍

白朮

已上各
一兩

甘

草

半兩炙
微赤剉

赤茯苓

一兩

右搗篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服

桂心散

出聖惠方

治傷寒發汗過多其人以手捫心下悸欲

得按者

桂心

甘草

炙微赤剉

人參

去蘆頭

白朮

枳實

半兩麩炒微黃

右搗麤羅為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓

不計時候溫服

芎藭散

出聖惠方

治傷寒已得汗其人仍發熱心下悸頭痛目

眩心神煩喘

芎藭

桔梗

去蘆頭

前胡

去蘆頭

石膏

人參

去蘆頭

白

茯苓 麥門冬

去心已上
各一兩

旋覆花

半兩

枳殼

麩炒微黃
去穢半兩

右搗麤羅為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗

三枚煎至六分去滓不計時候溫服

甘草散

出聖惠方

治傷寒脈結代者心下悸也

甘草

炙微赤剉

茯苓

遠志

去心

蒼朮

已上各一兩

枳實

半兩麩炒微黃

右搗麤羅為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎

至五分去滓不計時候溫服

治傷寒未得汗心悸而煩頭目不利宜服此方

出聖惠方

桂心

一兩剉

甘草

半兩炙微赤剉

生薑

一分切

大棗

五枚去核

飴糖

一兩

右件藥水一大盞半煎至一盞次出入飴糖更煎三

五沸去滓不計時候分為二服

桂枝湯

出聖惠方

治傷寒水在心下心悸動欲得人按

桂

去粗皮二兩

赤茯苓

去黑皮一兩半

白朮

一兩三分

甘草

炙剉

陳橘皮

湯浸去白焙半兩

右麤搗篩每服五錢以水盞半煎取七分去滓溫服

不拘時

赤茯苓湯

出聖濟總錄

治傷寒飲水過多心下悸動不定

赤茯苓

去黑皮 二兩

陳橘皮

湯浸去白 焙二兩

白朮

三分 半夏 湯浸

七遍切 焙二兩

枳殼

麩炒去穰半兩

人參

一兩

右麤搗篩每服五錢以水一盞半入生薑半分拍碎

同煎取八分去滓溫服不拘時候

茯苓半夏湯

出聖濟總錄

治傷寒嘔噦心下悸動胸膈有滿

水往往頭眩

赤茯苓

去黑皮 二兩

半夏

湯洗七遍 炒乾二兩

陳橘皮

湯洗去白 焙一兩

右麤搗篩每服五錢以水一盞半入生薑一分拍碎

同煎至七分去滓溫服晚再服

茯苓白朮湯 治傷寒吐後心下逆滿忪悸不定起即

頭眩

赤茯苓

去黑皮一兩

白朮

二分桂去粗皮三分

芍藥

一兩

甘草

炙剉半兩

右麤搗篩每服三錢以水一盞煎至六分去滓溫服

茯苓桂枝湯 治傷寒發汗後引飲過多心下悸動

赤茯苓

去黑皮桂去粗皮

半夏

湯洗七遍炒乾各一兩

甘草

炙剉半兩

右麤搗篩每服三錢以水一盞入生薑半分拍碎同

煎至七分去滓溫服

桂心湯 治傷寒心下有飲悸動不定

桂

去粗皮
一兩

檳榔

剉

半夏

湯浸七遍
炒各半兩

右咬咀如麻豆大每服四錢以水一盞半入生薑五片同煎至七分去滓食前溫服如人行三里再服治傷寒脈結代者

右用甘草三兩水三升煮取一升半服七合日三

炙甘草湯 治虛勞不足汗出而悶脈結代行動如常

不出百日危急者十一日死

甘草

四兩炒

桂枝

生薑

各三兩

麥門冬

半升

麻仁

半升

人

參

阿膠

各二兩

大棗

三十枚

生地黃

一升

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓內

膠酒盡溫服一升日三服

半夏麻黃丸 治心下悸者

半夏 麻黃

等分

右二味末之煉蜜和丸小豆大飲服三九日三服

傷寒煩喘

論

夫傷寒喘其症不一有邪氣在表表未解無汗而喘者有邪氣在裏汗出不惡寒腹滿而喘者有潮熱者有心下有水而喘者古人治之亦各求其本故在表者當汗之在裏宜下至於心下有水而喘則又當利其小便也若乃陰症發喘是為無陽非灸之不可傷寒太陽病下之後喘者外未解故也大發汗後飲水者必喘以水停心下腎氣乘心故喘也或飲水過多入腎亦喘也

傷寒喘者肺主氣停寒飲冷則傷肺故其氣逆而上行
衡衡而氣急喝喝而息數張口擡肩搖身捧腹是為喘
也傷寒喘者為邪氣在表氣不利而喘者有水停之氣
射肺而喘者各不同也喘氣作桂枝加厚朴杏仁湯太
陽病骨節疼痛頭疼腰疼惡風身無汗而喘者發汗後
飲水多必喘以水灌之亦喘傷寒心下有水氣乾嘔發
熱而欬或喘者小青龍湯去麻黃加杏仁主之是欲發
散水寒也經曰喘而汗出者與葛根黃芩黃連湯以利

之汗出而喘者與麻黃杏子甘草石膏湯以發之二者如何而然也蓋邪氣內攻氣逆不利而喘者因喘而汗出見其邪氣在裏也雖表未解未可下之若邪氣外盛壅遏使氣不利而喘者雖汗而喘不已見其邪氣在表也雖經汗下亦可發之此亦古人之奧義傷寒止於邪氣在表而喘者心腹必濡而不堅設或腹滿而喘則又為可下之證經曰短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也為因滿腹而喘矣又或邪氣內盛正氣欲脫

氣壅上逆亦主喘也經曰直視譫語喘滿者又有汗出
髮潤喘不休者此為肺絕身汗如油喘而不休此為命
絕皆為不治喘也省疲問病更宜消息 活人歌云喘
不熱熱屬脾家汗多潮熱裏攻邪滿胸合病尤須汗水喇
青龍杏去麻經云脈氣實則喘氣迎所以氣逆者邪氣
為實耳傷寒發喘邪氣在表者心腹濡而不堅外症無
汗法當汗之邪氣在裏者心腹脹而為滿外症有汗法
當下之又有水氣作喘怔忡即水為邪是以有小青龍

之症若經汗下逐水不獲至於喘促上攻壅塞而不得
息可以瓜蒂散從吐之吁喘時病之常也其或直視譫
語而喘汗出髮潤而喘汗出如油而喘皆不可救此邪
氣內盛而正氣欲絕臨機對症蓋消息焉麻黃專主喘
喘家湯劑多用麻黃太陽症汗而喘麻黃湯以解下之
利不止脈促有汗而喘葛根黃芩黃連湯下之微喘者
桂枝加厚朴杏仁湯發汗後不可更行桂枝湯若汗出
而喘無熱者麻黃杏仁甘草石膏湯陽明症汗不惡寒

氣短腹滿潮熱而喘小承氣湯脈浮無汗而喘即汗之
用麻黃湯太陽陽明合病喘而胸滿切不可麻黃湯水
氣嗽喘乃太陽汗後飲水多而水停心下小青龍去麻
黃加杏仁桂枝小腹滿者小青龍去麻黃加茯苓陰症
喘則必促脈伏而厥逆陰丹五味子湯鼻息鳴喘氣逆
上衝孫用和用麻黃湯加橘皮杏仁久喘咳嗽高胸鼻
涕易簡丸實湯

方

麻黃散 治傷寒煩熱喘促

麻黃

去根節

木通

剉

紫蘇莖葉

赤茯苓

生乾地

黃

枳實

麩炒微黃

天門冬

去心焙已上各一兩

甘草

一分炙微赤剉

右搗麤羅為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎

至六分去滓不計時候溫服

紫蘇散

出聖惠方

治傷寒煩喘胸膈滿悶不思飲食

紫蘇莖葉

赤茯苓

桔梗

去蘆頭

枳殼

麩炒微黃去穢

川

大黃

剉碎令微炒

陳橘皮

湯浸去白焙

柴胡

去苗

前胡

大腹

皮

劉麥門冬

去心

郁李仁

湯浸去皮
尖微炒

訶梨勒皮

已上
各半

兩

甘草

一分炙
赤劉

右搗羅為散每服四錢水一中盞生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

生乾地黄散

出聖
惠方

治傷寒心煩喘急欬逆多涎唾有血

者

生乾地黄

一兩

赤茯苓

一兩

紫蘇子

微炒

桔梗

去蘆
頭

杏仁

湯浸去皮尖
雙仁麩炒黃

陳橘皮

湯浸去
白穢焙

人參

去蘆頭
各半兩

甘草

一分

灸微

赤劉

右搥篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服

治傷寒頭痛壯熱涕唾稠沾鼻塞氣喘心煩宜服此方

出聖

惠方

麻黃

一兩半
去根節

前胡

一兩半
去蘆頭

白前

一兩半

桑根白皮

一兩

半劉

石膏

二兩

甘草

一兩炙
微赤劉

陳橘皮

一兩湯浸
去白穢焙

杏仁

一兩

湯浸去皮尖雙

仁麝炒微黃

右搗麤羅為散每服四錢水一中盞入生薑半分葱

白二莖煎至六分去滓不計時候溫服

貝母散

出聖惠方

治傷寒汗出而喘促煩熱頭痛者

貝母

三分煨微黃

百合

三分

杏仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃

赤茯

苓

三分

麻黃

一兩去根節

石膏

二兩

甘草

一兩炙微赤剉

人參

一兩去蘆

頭

柴胡

一兩去苗

右搗麤羅為末每服四錢水一中盞入生薑半分煎

至六分去滓不計時候溫服

治傷寒汗出不解曾經吐下後心胸痞滿煩喘不除宜服此方

桑根白皮

一兩劉

旋覆花

半兩

甘草

半兩炙微赤劉

人參

一兩去蘆

頭

木香

一兩

枳殼

一兩麴炒微黃去穢

半夏

半兩湯浸七遍去滑

檳榔

一兩

右搗篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒七八日肺臟壅熱大腸不通小便黃赤心神煩

喘宜服此方

出聖惠方

紫蘇莖葉

木通

劉

桑根白皮

劉

紫苑

洗去苗土

黃芩

已上各一兩

川大黃

一兩半碎微炒

赤茯苓

一兩

甘草

半兩炙微赤

右搗篩為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

檳榔散

出聖惠方

治傷寒氣壅煩喘腹脇妨悶不欲飲食

檳榔

半兩

訶梨勒皮

一兩

桑根白皮

半兩

木香

一分

桂心

一分甘草

一分炙微赤劉

川大黃

三分劉碎微炒

人參

半兩去蘆頭

赤茯苓

苓

三分

枳殼

三分麩炒微黃去核

右搗細羅為散每服二錢水一中盞入生薑半分棗二枚煎至五分即去薑棗不計時候和滓溫服

治傷寒頭痛百節痠疼氣壅煩喘宜服此方

出聖惠方

麻黃

一兩去根節

甘草

三分炙微赤剉

赤芍藥

三分

桂心

半兩

杏仁

半兩湯浸去皮尖

石膏

一兩半杵碎

雙仁麴炒微黃

右搗細剉拌令勻分為三服每服水一大盞半煎至

一盞去滓不計時候分溫二服如人行五七里再

服以汗出為度

小青龍去麻黃加杏仁湯

出活人書

治傷寒心下有水氣欬

而發喘

芍藥

桂

去粗皮

甘草

炙

細辛

去苗葉

五味子

炒

乾薑

炮製

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麤炒各三兩

半夏

湯浸七遍切焙二兩半

右剉如麻豆大每服五錢以水一盞半煎取七分去

滓溫服

麻黃杏仁甘草石膏湯

出千金方

治傷寒下後不可更行桂

枝湯汗出而喘無大熱者

麻黃

去根節沸湯掠
去沫焙四兩

杏仁

去皮尖雙仁
炒五十枚

甘草

炙二兩

石膏

半斤
碎

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎取八分去滓

溫服

茯苓湯

出聖濟
總錄

治傷寒心下有水氣肺氣虛脹喘急咽

燥

赤茯苓

去黑皮

石膏

各一兩半

芍藥

三分

半夏

一兩湯浸七
遍炒令乾

細辛

去苗葉

桂

去粗皮

五味子

各半兩

麻黃

去根節沸湯
掠去沫焙

桑根白皮

劉各
一兩

右剉如麻豆大每服五錢以水一盞半入生薑一分

拍碎同煎至八分去滓溫服

猪苓湯

出聖濟
總錄

治傷寒表不解心下喘滿及大小便閉

塞

猪苓

去黑皮

赤茯苓

去黑皮

白朮

炒

麻黃

去根節

桂

去粗皮

葶藶

微炒

澤瀉

各等分

右麤搗篩每服三錢以水一盞生薑三片同煎至七

分去滓溫服

馬兜零湯

出聖濟
總錄

治傷寒後肺氣喘促

馬兜零

一分木通

剉一兩

陳橘皮

湯浸去白
焙半兩

紫蘇莖葉

分三

右麤搗篩每服五錢以水一盞半入燈心十五莖棗

三枚擘破同煎至七分去滓食後溫服日二

木香丸

出聖濟
總錄

治傷寒後肺氣上喘咽喉噎塞頭面虛

浮

木香

一兩 昆布

湯洗去鹹味焙乾

海藻

湯洗去鹹味炒令乾

乾薑

炮製各三

分

海蛤

別粉

細辛

去苗葉

蜀椒

去目及閉口微炒令汗出各半兩

右將六味搗羅為末入海蛤同研令勻煉蜜和更搗

三五百杵九梧桐子大每服空心米飲下十五丸

大腹皮湯

出聖濟總錄

治傷寒汗後發喘壯熱不除

大腹皮

劉

柴胡

去苗各一兩

赤茯苓

去黑皮三分

桑根白皮

微炙劉

半兩

右麤搗篩每服三錢以水一盞入生薑三片同煎至

六分去滓不計時候溫服

芸臺子丸

出聖濟
總錄

治傷寒後喘欬不得卧卧則氣壅心

胸滿悶

芸臺子

一兩
微炒

葶藶

微炒一兩
半

馬兜零

半兩
紫苑

杏

仁

湯浸去皮尖雙仁麩
炒令黃細研一兩半

白前

防已

人參

皂莢

酥炙合黃
去皮子

甘草

各半兩炙
令微赤

右搗羅九味為末入杏仁同研令勻煉蜜和搗三五

百杵丸如梧桐子大每服食前童小便煎烏梅湯

下二十九日二

木香丸

出聖濟總錄

治傷寒後脾虛冷上攻氣喘

木香

肉豆蔻

去殼各半兩

白茯苓

人參

三分桂皮去粗

檳榔

劉各一兩

丁香

一分阿魏

用酒研如泥入麴少許拌和作餅炙令黃熟一分

右搗羅為末煉蜜和更搗三五百杵丸如梧桐子大

每服食後米飲下二十九

桂枝加厚朴杏仁湯

出聖濟總錄

治傷寒太陽病下之微喘

者表未解故也

桂

去粗皮

芍藥

各三兩

甘草

厚朴

去粗皮生薑汁炙各二兩

杏仁

五十枚

去皮尖

右剉如麻豆大每服五錢以水一盞入生薑一棗大切大棗二枚擘煎取八分去滓溫服戊申正月有一武臣為寇所執置舟中橫板下數日得脫乘饑恣食良久解衣捫虱次日遂作傷風寒自汗而膈不利一醫作傷寒而下之一醫作解衣中邪而汗之雜治數日漸覺昏困上喘息高醫者愴惶失措

予診之曰太陽病下之表微喘者桂枝加厚朴杏
仁湯此仲景之法也指令醫者急治藥一吸喘定
再吸些微汗至晚身涼而脈已和矣醫曰某平生
不曾用仲景方不知其神捷如是予曰仲景之法
豈誑後人也或人自寡學以發明耳

枳實湯 治病人氣上衝心胸痞喘急以有寒飲也

枳實

一兩
炙

橘皮

半夏

一兩

生薑

厚朴

各三
兩

右五味以水六升煮取三升去滓溫服一升咽痛加

桔梗一兩

五味子湯

出活人書

治傷寒喘促脈伏而厥

人參 麥門冬

去心

杏仁

去皮尖

橘皮

去白各一兩

五味子

半兩

右剉如麻豆大生薑汁片棗子三枚水三大白盞煎至一盞半去滓分二服

傷寒上氣

論

夫傷寒毒氣不退上焦煩熱則傷於肺肺主於氣邪熱

壅滯則肺葉虛脹衛氣不行故令上氣也 傷寒上氣者肺主氣手太陰是其經也病人肺氣有風不調又遇寒熱邪氣傷於其經則脹而氣逆不下故令上氣

方

麥門冬散

出聖惠方

治傷寒心肺氣壅涕唾稠粘胸腹脹滿

上氣喘促

麥門冬

一兩 去心

甘草

半兩 炙 微赤剉

半夏

三分 湯洗 七遍去滑

紫苑

三分

洗去苗土

桑根白皮

一兩 剉

木通

半兩 剉

五味子

半兩

桔梗

三分

去蘆 陳橘皮 半兩湯浸
頭 去白穰焙

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分淡竹
茹煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒上氣喘促眠卧不得宜服此方

出聖
惠方

麻黃

二兩去
根節

甘草

半兩炙
微赤剉

紫苑

一兩洗
去苗土

貝母

一兩
半煨

令微
黃

杏仁

一兩湯浸去皮尖
雙仁麩炒微黃

紫蘇子

一兩
微炒

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至
五分去滓不計時候溫服

赤茯苓散

出聖惠方

治傷寒腹脇虛脹上氣咽燥脈浮者心

下有水氣

赤茯苓

一兩半

麻黃

一兩半去根節

赤芍藥

一兩半

浸七遍

去滑細辛

三分

桂心

三分

五味子

一兩

訶梨勒皮

一兩

皮

一兩半判

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候溫服

桑白皮散

出聖惠方

治傷寒痰唾無恒上氣喘急胸中滿悶

坐卧不安面目微腫

桑根白皮

劉 一兩

赤茯苓

兩 三

半夏

七分湯洗
七遍去滑

旋復花

一兩 陳橘皮

三分湯浸
去白穢焙

大腹皮

劉 一兩

前胡

一兩去
蘆頭

麻

黃

一兩去
根節

紫苑

三分洗
去苗土

杏仁

一兩湯浸去皮尖
雙仁麩炒微黃

枳

殼

一兩麩炒
微黃去穢

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三

枚煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒上氣喘急心胸滿悶宜服此方

出聖
惠方

紫蘇子

一合 微炒

麻黃

一兩去根節

檳榔

一兩

陳橘皮

一兩 剉

杏

仁

一兩湯浸去皮尖 雙仁麤炒微黃

甘草

半兩炙 微赤剉

右搥篩為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候溫服

訶梨勒丸

出聖惠方

治傷寒氣壅心胸不利上氣欬嗽腹脇

妨悶

訶梨勒皮

一兩

大腹皮

一兩剉聖濟用一兩半

半夏

一兩湯洗七遍去滑

桑根白皮

一兩剉

前胡

一兩去蘆頭

枳實

半兩麤炒微黃

漢防己

半
兩 紫苑

三分洗
去苗土

杏仁

一兩半湯浸去皮尖雙
仁麩炒微黃別研如膏

甜葶

蘆

一兩隔紙炒令
紫色別研如膏

右為細末入杏仁葶蘆更研令勻煉蜜和搗三二百

杵丸如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下二

十九聖濟大腹皮薑棗湯下

檳榔丸

出聖
惠方

治傷寒心胞不利上氣喘促腹脇妨悶

檳榔

一兩

木香

半兩

訶梨勒皮

一兩

枳殼

半兩麩炒

人參

微黃去穢

半兩去
蘆頭

赤芍藥

五分

桂心

三分

半夏

半兩湯洗

七遍去滑

右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每

服不計時候生薑湯下二十丸

半夏湯

出聖濟
總錄

治傷寒後上氣咽喉不利胸膈多痰氣

逆

半夏

湯洗七遍
炒乾一兩

桂

去粗皮
半兩

甘草

炙一兩

檳榔

剉三分

陳

橘皮

湯浸去
白焙

枳殼

去穰麩炒
各半兩

右麤搗篩每服五錢以水一盞半生薑一分拍碎同

煎至八分去滓食後溫服

竹茹湯

出聖惠方

治傷寒後上氣煩滿客熱在臍乾嘔口中

生瘡不得飲食

青竹茹 葛根

各一兩

半夏

湯洗七遍焙乾

麥門冬

去心焙各五分

甘草 陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

右麤搗篩每服五錢以水一盞半生薑一分拍碎同

煎至八分去滓食後溫服

貝母湯

出聖惠方總錄

治傷寒飯後水多卒上氣發熱

貝母

炮去心

桑根白皮

剉

款冬花

各一兩

陳橘皮

湯浸去白

焙半
兩

甘草

炙一分

右麤搗篩每服五錢以水一盞半竹葉三七片同煎

至八分去滓食後溫服

五嗽丸

出聖濟
總錄

治傷寒後上氣欬嗽

乾薑

炮

皂角

塗酥炙令
黃去皮子

桂

去粗皮
各等分

右搗羅為末煉蜜和杵三五百下丸如梧桐子大每

服二十丸食後米飲下日二

葶藶丸

出聖濟
總錄

治傷寒肺壅上氣多痰

葶藶

隔紙微炒一兩

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麴炒黃別研一兩

防已

一兩半

甘

草

炙半兩

赤茯苓

去黑皮一兩

右搗羅四味為末杏仁同研勻以棗肉和丸如梧桐

子大每服二十九食後煎桑白皮湯下日二微利

即止

白前丸

出聖濟總錄

治傷寒後上氣欬嗽

白前 貝母

炮去心

人參

紫苑

去苗土各一兩

款冬花

三分

桑根白皮

炙

葶藶

隔紙微炒

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麴黃別研如膏各

一兩

右搗羅七味為末杏仁同研勻以煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食後米飲下漸加至二十九

天門冬丸

出聖濟總錄

治傷寒後心肺熱上氣喘逆

天門冬

去心焙

白茯苓

去黑皮

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒黃別研各一兩

貝母

去心

生乾地黄

焙

甘草

炙

人參

烏梅

炒各半兩

右搗羅七味為末入杏仁研令勻煉蜜和更杵三百下丸如彈子大食後含化一九嚥津日可三五丸

葶藶湯

出聖濟
總錄

治傷寒後上氣喘麤身面腫小便澀

葶藶子

隔紙微
炒半兩

大棗

去核
五枚

右二味用水一大盞煎至半盞去滓不計時候溫服

麥門冬湯

出聖濟
總錄

治傷寒後傷肺欬唾有血胸脇脹滿

上氣羸瘦

麥門冬

去心
焙

桑根白皮

炙
剉

生乾地黄

各一
兩

桔梗

炒
三

分

半夏

湯洗七
遍焙乾

紫苑

去苗
土

淡竹茹

麻黃

去根節
各三分

五味子

甘草

炙各
半兩

欽定四庫全書

普濟方
卷一百三十七

辛酉

右麤搗篩每服五錢以水一盞半生薑一分拍碎棗
三枚擘破同煎至七分去滓食後溫服

貝母丸

出聖濟
總錄

治傷寒心肺有熱咳嗽上氣喉中作聲

痰涕口乾

貝母

去心
二兩

甘草

炙三
分

旋復花

半
兩

天門冬

去心焙
一兩

杏

仁

湯浸去皮尖雙
仁研如膏四兩

右搗羅四味為末入杏仁同研勻煉蜜和杵三五百

下丸如彈子大每食後含化一丸嚥津

訶梨勒丸

出聖濟
總錄

治傷寒後脾胃不和食飲無味上氣

壅悶

訶梨勒

炮去
核

半夏

湯洗七遍
焙乾炒

白朮

各一
兩

檳榔

剉半
兩

人參

三分

枳殼

去穢麤
炒半兩

芍藥

桂

去粗皮
各三分

右搗羅為末煉蜜和杵三五百下丸如梧桐子大每

服二十丸食後生薑湯下日二服

人參湯 主霍亂大煩渴身熱上氣者

人參 茯苓 甘草 桑白皮 黃耆 白朮

生薑

各一兩

大棗

六枚

右八味以水四升煮取二升去滓溫服五合

李根湯

出活人書

治氣上衝正在心端

半夏

湯洗半兩

桂枝

一兩

當歸

芍藥

茯苓

黃芩

甘草

炙各一兩

甘李根白皮

二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢以生薑四片水一盞半

煎至八分去滓溫服

如聖加枳實湯

出濟生拔萃方

治傷寒噎氣者何氣使然答曰

胸中氣不交故也少陰經至胸中交於厥陰水火之相搏而有聲故噎氣也

甘草

桔梗

枳實

炒各五錢

右剉細每服五錢入五味子半錢水煎

如聖加吳茱萸湯

出濟生拔萃方

治傷寒氣逆而甚無汗下症

甘草

桔梗

吳茱萸

炒各五錢

右剉細每服五錢入五味子半錢同煎

傷寒嘔吐

論

夫傷寒嘔吐嘔者有聲者也俗謂之哕吐出其物也故有乾嘔而無乾吐是以於嘔則曰食穀欲嘔及吐則曰飲食入口即吐則嘔吐之有輕重可知矣傷寒嘔有責為熱者有責為寒者至於吐家則悉言虛冷也經曰太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛又曰胃中虛冷故吐也醫家則不然嘔有熱者有寒者有停飲者有胃腕有膿者皆當明辨之嘔而發熱者柴胡湯主之與其嘔不止心下急鬱鬱微煩大柴胡湯主之者

皆邪熱為嘔者也。膈上有寒飲乾嘔者不可吐也。當溫之。與其乾嘔吐涎沫頭痛者。吳茱萸湯主之。是寒邪為嘔者也。先嘔後渴者。此為解。先渴後嘔者。為水停心下。此屬飲家。是停飲嘔者。嘔家有癰膿。不須治。膿盡自愈。是胃脘有膿而嘔者。諸如此者。雖有殊別。大抵傷寒表邪欲傳裏。裏氣上逆。則為嘔也。是以半表半裏症多云嘔也。傷寒三日。三陽盡。三陰當受邪。其人反能食而不嘔。此為三陰不受邪。是知邪氣傳裏者。必致嘔也。至於

乾薑附子湯症云不嘔不渴為裏無熱十棗湯症云乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解未和也即此觀之其嘔為裏熱明矣嘔家之為病氣逆者必散之痰飲者必下之嘔家多服生薑此為嘔家聖藥是要散其逆氣也又曰用半夏者以去其水水去嘔則止是要下其痰飲也嘔多雖有陽明症不可攻者謂其逆而未收斂為實也其嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者已為難治蓋謂其虛寒之甚也醫者必審其邪氣之虛實病症之逆

順為施藥九治則當矣 歌括曰脈浮有表并虛細嘔
吐惡寒無失氣大便堅硬小便清或少或多當自利脈
浮者為有表也不可下大抵脈虛細不可下為有表也
表症未罷不可下脈虛細王叔和脈微不可吐陽明病
屬表可發汗若嘔吐仲景云嘔多雖有陽明症切不可
下惡寒者太陽陽明大承氣湯大便堅硬是少陰症宜
溫之無失氣者謂不轉失氣也特恐津液還入胃而先
硬後溏也每日三四小便清者不在裏也桂枝湯大便

堅而小便少不久當利大便也大便堅而小便多其脾約今日再行此津液還入胃中數為熱緩為寒中太陽合病下利腎症之為約又歌曰嘔吐陽明逆氣氣上逆則為嘔吐水穀不下是也傷寒嘔吐有候各有評表邪傳裏裏膿血辨四者而已胃熱脈數或緊必有口粘舌乾煩渴胃熱有火胃寒有水氣右脈弦而遲必有逆冷下食大小便自利之症水氣者先後之症胃寒者若胃脘膿血則腥氣燥氣奔逆上衝經所謂嘔家有癰膿不

嘔膈滿怔忡又謂桂枝湯宜服吐者其後必吐膿血是
矣大抵嘔吐皆有辨須治自愈咽而出嘔也未下咽而
出者吐也吐特甚於嘔耳若槩以嘔有所出與未咽而
吐同治所謂乾嘔者獨何耶嘔吐多屬陽明氣逆而上
行戒不可下汗灸水藥不入口者逆嘔而脈弱小便自
利微熱而厥者虛極難調也生薑嘔家聖藥熱燥者烏
梅代之活人書云無陽則厥無陰則嘔嘔者是陽明胃
之經足陽明之氣下行今厥而上行故為氣逆則嘔仲

景云嘔多雖不大便不可下與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和浹然汗出而解大抵嘔症不一各有治法要之小柴胡湯尤相主當耳急與小柴胡湯胸脇滿而嘔日晡發潮熱者柴胡湯加芒硝也若嘔不止心下忪鬱微煩者與大柴胡湯也閉者加大黃大柴胡治嘔最妙為內有積可下故也枳實去噦壓虛氣須是去大黃仲景云嘔多雖有陽明症慎半夏下官局桔梗湯最良亦用枳實耳方具第十七卷古人治嘔多用合病

必生薑孫真人云生薑是嘔家聖藥仲景云嘔皆用之
太陽與陽明有邪氣下利若不利但嘔者葛根加半夏
生薑湯主之胸中有熱胃中虛加腹痛欲嘔者黃連湯
主之太陽與少陽合病而自利若嘔者茯苓半夏生薑
湯主之金匱論嘔吐穀不得下者小半夏湯小半夏加
橘榔湯半夏加橘皮湯皆可選用也嘔而發熱者小柴
胡湯主之嘔為水渴者猪苓湯主之先嘔却渴者此為
欲解急與之先渴却而嘔者腸停心下此屬飲家仲景

云本渴飲水而嘔者柴胡不中與也宜治汗間有水赤
茯苓湯主之若少陰而嘔者真武湯去附子加生薑也
若有或吐或下後虛煩不時復若嘔者梔子生薑湯主
之傷寒差後嘔者有餘熱在胃脘也竹葉湯加生薑主
之又云吐有冷熱二症寸口脈數心熱煩渴而吐以有
在胃脘故致煩渴而為吐五苓散主之傷寒有表症
渴欲飲水水入口即吐者名曰水逆由心經受熱而小
腸不利故也宜服五苓散發汗後水藥不得入口為逆

若更發汗必吐下不止小半夏加茯苓湯小半夏加橘
皮湯主之曾經汗下關脈遲胃中虛冷而吐乾薑黃連
黃芩人參湯主之寒多不飲水而吐者理中湯去朮加
生薑主之少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不
能吐始得之手足寒脈弦遲者此由胸中實不可下也
當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之宜氣
逆湯吐利手足逆冷煩燥甚者吳茱萸湯主之若傷寒
解後虛羸少氣逆欲吐竹葉石膏湯主之嘔吐而下利

有兩仲景云復寒發熱汗出不解心病硬嘔吐而下利者大柴胡湯下之又有霍亂症霍亂嘔吐而利熱而渴者五苓散寒多不飲水者理中丸或有寒腹滿痛或四肢拘急下利脚轉筋理中湯加附子一枚生用並麤末作湯服之吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之少陰病吐利手足逆冷煩燥欲死吳茱萸湯主之吐利止而身體痛不休者當消息解其外宜桂枝湯仲景大柴胡一症云傷寒發熱汗出不解心中痞

和吐而下利者大柴胡主之即非霍亂也吐利已汗出而厥四肢拘急不解脈微欲死者通脈四逆加猪膽湯若夏月中暑霍亂上吐下利心腹撮痛大渴煩燥四肢逆冷冷汗自出兩脚轉筋者宜服香薷散井中浸極冷頻服之乃效香薷散夏月初宜合下以備此症其他藥不能救乃須浸冷併服之效矣

方

橘皮湯 治陽明病嘔吐痰水青黃胸中煩者

橘皮

甘草

炙

葛根

麥門冬

去心
一兩

半夏

四兩
切焙

竹

茹

一兩

小麥

三合

右以水七升先煮葛根減二升去上沫內諸藥生薑

三兩煮取三升去滓再煮取二升溫服七合

和胃丸

治陽明病心下痛而嘔吐腹脇滿者以有停

水也

大黃

酒浸

甘遂

桂枝

乾薑

白朮

茯苓

芍

藥

厚朴

半夏

洗已上
各一兩

巴豆

十粒去皮
心研如脂

右搗篩入巴豆煉蜜和丸如梧桐子大白飲下兩丸

大黃甘草湯

出金匱方湯

治食已即吐者

大黃

四兩

甘草

一兩

右以水三升煮取一升分溫再服

茯苓澤瀉湯

出金匱方

治胃反吐而渴欲飲水者

茯苓

半斤

澤瀉

四兩

甘草

桂枝

二兩

白朮

三兩

生薑

四兩

右以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取二升半溫服

八合日三服

文蛤湯

出金匱方

治吐後渴欲得水而貪飲者兼主微風脈

堅頭痛

文蛤

五兩

麻黃

甘草

生薑

各三兩

石膏

五兩

杏仁

五十

枚

大棗

十二枚

右以水六升煮取二升溫服一升汗出愈

猪苓散

出金匱方

治嘔吐而病在膈上吐後思水者解急與之

水此並宜服

猪苓 茯苓 白朮

各半分

右杵為散飲服方寸匕日三服

藿香湯 治傷寒後胃氣未和嘔吐不下食

藿香

竹茹

陳橘皮

湯浸去白焙

麥門冬

去心焙

枇杷

葉

去毛姜汁炙各半兩

人參

三分

右麤搗羅每服五錢以水一盞半入生薑半分拍碎

同煎至七分去滓溫服

薤白飲 治傷寒後脾胃虛冷嘔逆不下食

薤白

切五莖

生薑

切一兩

附子

炮製去皮臍剉一分

右以水一盞半煎至七分去滓再煎沸入鷄子白一枚攪勻空心溫服

薑朮半夏湯

出保生
回車論

乾薑

二兩
炮

白朮

二兩

半夏

二兩湯浸七
次片切焙乾

右剉碎如麥豆拉為散每服四錢水一盞半生薑五片同煎至七分去滓溫服日進三服不拘時候

普濟方卷一百三十七